

Thuốc Ức Chế 5-Alpha-Reductase (Thuốc làm nhỏ tuyến tiền liệt) **WARWIKI**

Thông tin cho bệnh nhân · Thuốc dần dần làm nhỏ tuyến tiền liệt phì đại

Thuốc ức chế 5-alpha-reductase là thuốc uống giúp **từ từ làm nhỏ tuyến tiền liệt phì đại (BPH)**, cải thiện dòng nước tiểu và giảm nguy cơ tắc niệu đạo và phẫu thuật tuyến tiền liệt theo thời gian. Hai loại thuốc trong nhóm này là **finasteride (Proscar)** và **dutasteride (Avodart)**. Thuốc có tác dụng từ từ — cần kiên nhẫn dùng trong vài tháng.

Cơ chế hoạt động

Thuốc ức chế quá trình chuyển đổi testosterone thành **DHT**, hormone thúc đẩy sự tăng trưởng tuyến tiền liệt. Khi DHT giảm, tuyến tiền liệt **dần dần co nhỏ**, làm thông rộng đường dẫn nước tiểu. Vì quá trình này mất thời gian, tác dụng đầy đủ thường đến sau **3–6 tháng** — đây không phải thuốc tác dụng nhanh và thường được dùng kết hợp với thuốc chặn alpha tác dụng nhanh.

Điều có thể xảy ra

- Phù hợp nhất với tuyến tiền liệt **kích thước lớn**; hiệu quả tích lũy theo tháng.
- Uống **mỗi ngày một lần**, dùng lâu dài.
- Theo thời gian, thuốc làm giảm nguy cơ **bí tiểu** và cần phẫu thuật tuyến tiền liệt.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

5-ARI

Thuốc ức chế 5-alpha-reductase (finasteride, dutasteride).

BPH

Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (BPH) — tuyến tiền liệt phì đại.

DHT

Hormone thúc đẩy sự tăng trưởng tuyến tiền liệt; thuốc này làm giảm nó.

PSA

Xét nghiệm máu tuyến tiền liệt; thuốc này làm giảm kết quả khoảng một nửa.

Bí tiểu

Không thể làm rỗng bàng quang — nguy cơ này giảm dần theo thời gian.

Finasteride / dutasteride

Hai loại thuốc trong nhóm này.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÉT NGHIỆM PSA CỦA BẠN Thuốc này làm giảm **nồng độ PSA trong máu khoảng một nửa**. Điều này không gây hại, nhưng bác sĩ cần biết để đọc kết quả tầm soát ung thư tuyến tiền liệt đúng cách — thông thường, kết quả PSA sẽ được **nhân đôi** để so sánh với mức bình thường. Hãy đảm bảo mọi nhân viên y tế đều biết bạn đang dùng thuốc này.

Cách dùng thuốc

- **Mỗi ngày một lần**, vào cùng một giờ; hãy kiên nhẫn — tác dụng cần nhiều tháng.
- Không ngừng thuốc chỉ vì chưa thấy thay đổi ngay.
- Thường dùng lâu dài để duy trì kích thước tuyến tiền liệt nhỏ hơn.

Lưu ý an toàn quan trọng

- **Phụ nữ mang thai không được cầm** viên thuốc bị bể hoặc nghiền (có nguy cơ với thai nhi nam); viên thuốc nguyên vẹn còn lớp bao thì an toàn khi cầm.
- **Không hiến máu** trong khi dùng thuốc và một thời gian sau khi ngừng.
- Báo cho nhóm chăm sóc nếu có **thay đổi tâm trạng hoặc trầm cảm**, vì đây là các tác dụng phụ đã được ghi nhận.

Tác dụng phụ thường gặp

- Giảm ham muốn tình dục, khó cương dương hoặc lượng tinh dịch giảm
- Đau hoặc phì đại vú
- Một số nam giới gặp tác dụng phụ tình dục kéo dài — hãy trao đổi nếu lo ngại

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Cục cứng ở vú**, đau hoặc tiết dịch núm vú
- **Trầm cảm** mới xuất hiện hoặc thay đổi tâm trạng
- Không thể đi tiểu được (cần chăm sóc khẩn cấp)

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Thuốc ức chế 5-ARI từ từ làm nhỏ tuyến tiền liệt để cải thiện dòng nước tiểu và giảm nguy cơ bí tiểu và phẫu thuật — hãy dùng đủ 3–6 tháng.
2. Thuốc **làm giảm PSA khoảng một nửa** — đảm bảo bác sĩ tính đến điều này khi tầm soát ung thư tuyến tiền liệt.
3. Phụ nữ mang thai không được cầm viên thuốc bị bể, không hiến máu khi đang dùng thuốc. Báo ngay nếu có thay đổi ở vú hoặc trầm cảm mới xuất hiện.