

# Són Phân (Fecal Incontinence)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Mất kiểm soát khí hoặc phân — phổ biến và có thể điều trị

Són phân (rò rỉ phân ngoài ý muốn) là tình trạng mất kiểm soát khí hoặc phân — rò rỉ trước khi kịp vào nhà vệ sinh, hoặc không hay biết. Đây là tình trạng phổ biến hơn nhiều người nghĩ, đặc biệt sau sinh hoặc khi lớn tuổi, và hoàn toàn có thể điều trị được. Không có gì phải xấu hổ — nói với nhóm chăm sóc là bước đầu tiên để cải thiện.

## Về tình trạng này

Khả năng kiểm soát phân phụ thuộc vào **cơ vòng hậu môn**, sàn chậu, độ đặc của phân và các dây thần kinh điều phối chúng. Vấn đề với bất kỳ yếu tố nào cũng có thể gây rò rỉ — từ vết bẩn, xì hơi đến mất phân cục.

## Nguyên nhân

- **Tổn thương cơ vòng** — thường do sinh con (rách nặng) hoặc phẫu thuật hậu môn trước đó
- **Phân lỏng hoặc tiêu chảy** — khó giữ hơn phân cục
- **Táo bón nặng** với phân lỏng tràn ra xung quanh phân cứng
- **Vấn đề thần kinh**, sa trực tràng hoặc hội chứng ruột kích thích

Thường có nhiều hơn một nguyên nhân cùng lúc, và nhiều yếu tố có thể được cải thiện.

## GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

### Fecal incontinence (són phân)

Mất kiểm soát khí hoặc phân ngoài ý muốn.

### Cơ vòng hậu môn

Vòng cơ giữ phân cho đến khi bạn muốn đi vệ sinh.

### OASIS

Rách nặng (độ 3/4) khi sinh có ảnh hưởng đến cơ vòng.

### Chất xơ

Chất làm đặc phân lỏng, giúp giảm rò rỉ.

### Biofeedback

Liệu pháp tái luyện cơ sàn chậu và cơ vòng hậu môn.

### Kích thích thần kinh cùng (sacral neuromodulation)

Phương pháp kích thích thần kinh giúp cải thiện khả năng kiểm soát.

**CÓ THỰC SỰ CÓ CÁCH CẢI THIỆN KHÔNG?** Có — hầu hết người bệnh cải thiện rõ rệt, thường chỉ với các bước đơn giản như làm đặc phân và tái luyện cơ. Các phương pháp nâng cao cũng hiệu quả khi cần thiết. Phần khó nhất là đề cập đến vấn đề; một khi bạn làm vậy, sẽ có hướng điều trị rõ ràng để kiểm soát tốt hơn.

### Chẩn đoán như thế nào

- Hỏi về tần suất, mức độ và những gì kích hoạt rò rỉ
- Khám cơ vòng hậu môn và sàn chậu
- Đôi khi siêu âm cơ vòng, kiểm tra trực tràng-hậu môn, hoặc nội soi

### Điều trị như thế nào (từng bước)

- 1 **Kiểm soát phân** — bổ sung chất xơ để làm đặc phân, điều trị tiêu chảy hoặc táo bón, và thiết lập giờ đi vệ sinh đều đặn.
- 2 **Vật lý trị liệu sàn chậu / biofeedback** để tăng cường và phối hợp cơ.
- 3 **Thuốc** (như thuốc cầm tiêu chảy) khi phân lỏng.
- 4 **Phương pháp nâng cao** — kích thích thần kinh cùng, tiêm chất làm đầy, hoặc phẫu thuật phục hồi cơ vòng.

### Sống chung với tình trạng này

- Hướng đến **phân cục đặc** bằng chất xơ và uống đủ nước.
- Đi vệ sinh đúng giờ; bảo vệ da và mang theo vật dụng cần thiết để tự tin hơn.
- Theo dõi những thực phẩm làm nặng hơn tình trạng rò rỉ (caffeine, đồ cay, chất tạo ngọt nhân tạo).

#### Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Máu trong phân**, hoặc phân đen, dạng nhựa đường
- Thay đổi mới hoặc rõ ràng trong thói quen đại tiện, hoặc sụt cân không rõ lý do
- Sốt hoặc đau bụng dữ dội

### BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Són phân là tình trạng phổ biến và có thể điều trị — không phải điều bạn phải chịu đựng hoặc im lặng.
2. Điều trị bắt đầu bằng làm đặc phân và tái luyện cơ, sau đó nâng lên kích thích thần kinh hoặc phẫu thuật nếu cần.
3. Hãy nói với nhóm chăm sóc — đó là bước quan trọng nhất. Báo cáo ngay khi có máu trong phân, sụt cân hoặc thay đổi lớn trong thói quen đại tiện.