

Thuốc Chẹn Alpha (cho Tuyến Tiền Liệt / Lưu Lượng Nước Tiểu)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Thuốc giúp thư giãn cơ đường thoát để cải thiện dòng tiểu

Thuốc chẹn alpha là thuốc viên giúp **thư giãn cơ** ở tuyến tiền liệt và cổ bàng quang, giúp đi tiểu dễ hơn — thường là thuốc đầu tay cho các triệu chứng tiết niệu do **tuyến tiền liệt phì đại (BPH)**. Các loại phổ biến gồm **tamsulosin (Flomax)**, **alfuzosin**, **silodosin**, **doxazosin**, và **terazosin**. Thuốc có tác dụng nhanh nhưng không làm tuyến tiền liệt nhỏ lại.

Cơ chế hoạt động

Tuyến tiền liệt phì đại chèn ép ống dẫn nước tiểu. Thuốc chẹn alpha **thư giãn cơ ở cổ bàng quang**, giúp dòng tiểu mạnh hơn, giảm tình trạng khó khởi đầu, rặn tiểu và tiểu ngắt quãng. Thuốc điều trị **triệu chứng** — không thay đổi kích thước tuyến tiền liệt, vì vậy hiệu quả chỉ duy trì khi bạn uống thuốc.

Điều gì sẽ xảy ra

- Cải thiện thường đến **nhANH** — trong vòng vài ngày đến vài tuần.
- Thường uống **một lần mỗi ngày**; tamsulosin uống khoảng **30 phút sau bữa ăn** cùng giờ mỗi ngày.
- Doxazosin/terazosin nên bắt đầu **trước khi đi ngủ** và tăng liều từ từ để giảm chóng mặt.
- Có thể kết hợp với thuốc làm nhỏ tuyến tiền liệt cho trường hợp tuyến tiền liệt phì đại nhiều.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Thuốc chẹn alpha

Thuốc thư giãn cơ ở cổ bàng quang.

BPH

Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt — tuyến tiền liệt phì đại.

Cổ bàng quang

Đầu ra có cơ nối bàng quang với niệu đạo.

Xuất tinh ngược dòng

Tinh dịch đi ngược vào bàng quang — vô hại nhưng ít hoặc không có dịch.

Hạ huyết áp tư thế đứng

Chóng mặt do huyết áp thấp khi đứng dậy.

IFIS

Hội chứng mộng mất mềm trong phẫu thuật đực thủy tinh thể — hãy báo bác sĩ mắt.

SẮP PHẪU THUẬT ĐỤC THỦY TINH THỂ? Hãy báo cho bác sĩ mắt biết bạn đang dùng (hoặc đã từng dùng) thuốc chẹn alpha — thuốc có thể gây ra hội chứng mống mắt mềm (IFIS) trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, và bác sĩ sẽ chuẩn bị phù hợp. Điều này quan trọng **ngay cả khi bạn đã ngừng** thuốc.

Cách dùng thuốc

- Uống **đúng giờ mỗi ngày** theo hướng dẫn (tamsulosin khoảng 30 phút sau bữa ăn).
- Với doxazosin/terazosin, **uống liều đầu tiên trước khi đi ngủ** và đứng dậy chậm — liều đầu có thể làm huyết áp thấp và gây chóng mặt.
- Nếu quên liều, không uống gấp đôi để bù.

Lưu ý an toàn quan trọng

- Đứng dậy **từ từ**, đặc biệt khi mới dùng thuốc, để tránh choáng váng hoặc ngất.
- Thận trọng khi kết hợp với **thuốc ức chế PDE5** hoặc thuốc huyết áp (tăng nguy cơ chóng mặt).
- **Xuất tinh ngược dòng** (ít hoặc không có tinh dịch) thường gặp với tamsulosin/silodosin — vô hại và hồi phục nếu ngừng thuốc.

Tác dụng phụ thường gặp

- Chóng mặt hoặc choáng váng; mệt mỏi
- Nghẹt mũi
- Xuất tinh ít hoặc “khô”

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Ngất** hoặc chóng mặt nghiêm trọng
- Tim đập nhanh, mạnh, hoặc đau ngực
- **Không tiểu được hoàn toàn** (cần cấp cứu)

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Thuốc chẹn alpha nhanh chóng thư giãn cổ bàng quang giúp cải thiện dòng tiểu trong BPH — giảm triệu chứng nhưng không làm nhỏ tuyến tiền liệt.
2. Đứng dậy chậm khi mới dùng (tránh chóng mặt); xuất tinh ít hoặc khô là tác dụng phụ thường gặp và vô hại.
3. Luôn báo **bác sĩ mắt** trước khi phẫu thuật đục thủy tinh thể rằng bạn đang hoặc đã từng dùng thuốc chẹn alpha.