

تضخم البروستاتا الحميد (BPH) نمو غير سرطاني شائع جداً يصيب البروستاتا مع تقدم العمر. تضغط الغدة المتضخمة على مجرى البول وتسبب أعراضاً مزعجة. BPH ليس سرطاناً ولا يتسبب فيه، وثمة علاجات فعالة عديدة تتدرج من تغييرات بسيطة إلى أدوية فإجراءات جراحية.

عن هذه الحالة

تحيط البروستاتا بالجزء العلوي من الإحليل (مجرى البول). عند تضخمها تضيق المجرى وتسبب أعراض المسالك البولية السفلية (LUTS):

- تدفق ضعيف أو بطيء، وتردد في بدء البول، وتقطع في التدفق
- شعور بعدم إفراغ المثانة، وتقطر البول بعد الانتهاء
- كثرة التبول، وإلحاح شديد، والاستيقاظ ليلاً (التبول الليلي)

أهمية الحالة

يؤثر BPH عادةً في جودة الحياة، لكن إن كان شديداً قد يؤدي إلى عدوى بولية أو حصوات في المثانة أو احتباس البول أو، نادراً، ضرر للمثانة والكليتين. درجة الإزعاج هي التي تحدد مدى الحاجة إلى العلاج.

تعلم المصطلحات

BPH

تضخم البروستاتا الحميد — تضخم غير سرطاني في البروستاتا.

LUTS

أعراض المسالك البولية السفلية التي يسببها BPH.

IPSS

مقياس للأعراض يُستخدم لتقييم درجة الإزعاج.

الاحتباس

عدم القدرة على التبول — يستوجب الرعاية العاجلة.

حاصر ألفا / 5-ARI

النوعان الرئيسيان من أدوية BPH.

PSA

فحص دم للبروستاتا يُجرى عادةً ضمن التقييم.

هل يجب أن أعالج؟ فقط إذا كانت الأعراض تزعجك — الأعراض الخفيفة يمكن مراقبتها. حين تؤثر في حياتك تتدرج الخيارات من تعديل نمط الحياة إلى الأدوية فالإجراءات، وفي كل مرحلة خيار فعال. يعتمد العلاج أيضاً على حجم البروستاتا الذي يقيمه فريقك الطبي.

كيف تُقيّم الحالة

- مقياس الأعراض (IPSS) ومراجعة السوائل والأدوية
- فحص البروستاتا، وتحليل البول، وغالباً PSA
- قياس تدفق البول والتحقق من مدى إفراغ المثانة

كيف تُعالج (خطوة بخطوة)

- 1 **المراقبة وتعديل نمط الحياة** — تقليل السوائل مساءً، والحد من الكافيين والكحول، وتدريب المثانة.
- 2 **الأدوية** — حاصر ألفا (راحة سريعة)، أو مثبط 5-alpha-reductase (يقلص البروستاتا الكبيرة)، أو كليهما؛ وأحياناً أدوية أخرى.
- 3 **الخيارات الأقل توغلاً** — كرفع الإحليل البروستاتي أو علاج البخار.
- 4 **الجراحة** — TURP أو HoLEP أو Aquablation أو استئصال البروستاتا البسيط للغدد الكبيرة أو حين تفشل الخطوات السابقة. لكل منها نشرة خاصة.

معلومات مفيدة

- يعتمد قرار العلاج على مدى إزعاج الأعراض لك — لا تسرع ما لم تظهر مضاعفات.
- بعض أدوية البرد والحساسية (مزيلات الاحتقان) قد تفاقم الأعراض.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- عجز مفاجئ عن التبول (الم وامتلاء في المثانة) — حالة طارئة
- دم في البول، أو حمى، أو عدوى متكررة
- تفاقم الأعراض رغم العلاج

ثلاثة أمور تذكرها

1. BPH تضخم حميد شائع في البروستاتا يسبب أعراض ضعف التدفق وكثرة التبول.
2. يُحدّد العلاج بناءً على درجة الإزعاج: نمط الحياة أولاً، ثم الأدوية، ثم الإجراءات أو الجراحة.
3. اطلب الرعاية العاجلة إن عجزت فجأة عن التبول، أو ظهر دم في البول، أو حمى، أو عدوى متكررة.