

ناهضات beta-3 فئة حديثة من الأقراص لعلاج فرط نشاط المثانة (OAB) — الإلحاح، وكثرة التبول، وسلس البول الإلحاحي. تُرخّي هذه الأقراص المثانة لتزيد سعتها، وتسبب جفافاً في الفم وإمساكاً وتأثيرات في الذاكرة أقل بكثير مقارنةً بأدوية مضادات الكولين القديمة. الدواءان المتاحان هما ميرابيجرون (Myrbetriq) وفيبيجرون (Gemtesa).

كيف تعمل

تُنشّط مستقبلات beta-3 في جدار المثانة، مما يُرخّي عضلة المثانة أثناء الامتلاء. بهذا تقلّ نوبات الإلحاح والتكرار — عبر مسار مختلف عن مضادات الكولين.

ما الذي تتوقعه

- يظهر التحسّن تدريجياً خلال أسابيع قليلة؛ يُؤخذ مرة واحدة يومياً.
- مُحتمَل جيداً بوجه عام — جفاف الفم ضئيل أو معدوم.
- خيار جيد لكبار السنّ أو لمن عانوا جفافاً فم أو آثاراً جانبية من مضادات الكولين.
- يمكن أحياناً دمجه مع مضاد كولين للأعراض الشديدة.

تعلم المصطلحات

فرط نشاط المثانة (OAB)

الإلحاح وتكرار للتبول بسبب انقباض المثانة مبكراً.

agonist Beta-3

قرص يُرخّي المثانة عبر مستقبلات beta-3.

Mirabegron / vibegron

الدواءان في هذه الفئة.

Anticholinergic

فئة أقراص OAB الأقدم؛ ناهضات beta-3 تتفادى كثيراً من آثارها.

ضغط الدم

قد يرفع mirabegron ضغط الدم قليلاً — يُراقب دورياً.

لماذا تختار هذه الأقراص بدلاً من القديمة؟ تُحقّق ناهضات beta-3 فاعلية مماثلة لمضادات الكولين في علاج OAB لكن مع جفاف فم وإمساك أقل بكثير، ودون مخاوف الذاكرة — لذا تُفضّل غالباً، خاصةً لكبار السن. النقطة الرئيسية للمراقبة هي ضغط الدم.

كيف تتناولها

- تناوله مرة يومياً كما وُجّهت؛ أعطه أسابيع قليلة لتلاحظ التأثير.
- اجمعه مع تدريب المثانة وتمارين قاع الحوض للحصول على أفضل نتيجة.
- التزم بمواعيد المتابعة حتى يتحقّق الفريق الطبي من التحسّن ومن ضغط الدم.

آثار جانبية شائعة

- خفيفة عموماً — صداع، احتقان أنف
- ارتفاع ضغط الدم (بصفة رئيسية مع mirabegron)
- عدوى بولية أو إمساك خفيف

أمان مهم

- **Mirabegron قد يرفع ضغط الدم** — يُراقب دورياً، ويُتجنّب إذا كان الضغط مرتفعاً جداً أو غير منضبط. (Vibegron تأثيره على الضغط ضئيل).
- أخبر فريقك الطبي عن جميع أدويةك الأخرى — قد يؤثر mirabegron في مستويات بعضها.
- كما هو الحال مع أي علاج لـ OAB، أبلغ إذا واجهت صعوبة في إفراغ المثانة.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- ارتفاع شديد في ضغط الدم، أو صداع حاد
- تعذّر التبول أو الشعور بعدم إفراغ المثانة
- تورّم في الوجه أو الشفتين أو اللسان، أو صعوبة في التنفس (حساسية نادرة) — اطلب الرعاية الطارئة فوراً

ثلاثة أمور تنكّرهما

1. ناهضات beta-3 تُرخّي المثانة لتخفيف أعراض OAB مع جفاف فم أقل بكثير من الأقراص القديمة.
2. غالباً مناسبة لكبار السن أو عند ظهور آثار جانبية من anticholinergics؛ أعطها أسابيع قليلة.
3. Mirabegron قد يرفع ضغط الدم — حافظ على مواعيد متابعتك. اتصل إذا تعذّر التبول أو ارتفع الضغط فجأة.