

Bladder Botox علاج لفرط نشاط المثانة (OAB) — الإلحاح وكثرة التبول وسلس البول الإلحاحي — حين لم تُجدِ تغييرات نمط الحياة والأدوية. تُحقن كميات ضئيلة من ذيفان البوتولينيوم في عضلة المثانة عبر منظار صغير لإرخائها. يبدأ المفعول خلال 1-2 أسبوع ويستمر نحو 6 أشهر.

كيف تعمل

تتقبض عضلة المثانة المفرطة النشاط في أوقات غير مناسبة. يعمل Botox على إرخاء هذه العضلة فيوقف انقباضاتها غير المنتظمة، مما يُخفّف الإلحاح وكثرة التبول وسلس البول الإلحاحي. لن يكون المفعول فورياً؛ ستلاحظ التحسّن خلال 1-2 أسبوع.

هل هو آمن؟

نعم، هو علاج راسخ وثبتت سلامته. أهم ما ينبغي معرفته أن إرخاء المثانة قد يجعل تفريغها الكامل أصعب لدى عدد قليل من المرضى — وقد يحتاج هؤلاء إلى قسطرة ذاتية مؤقتة حتى يزول المفعول. لذا ينبغي أن تكون مستعداً لتعلّم القسطرة الذاتية عند الحاجة. تشمل الآثار الأخرى عدوى المسالك البولية ودم خفيف في البول.

تعلم المصطلحات

فرط نشاط المثانة

إلحاح وكثرة تبول ناجمان عن انقباض المثانة قبل اكتمالها.

ذيفان البوتولينيوم (Botox)

دواء يُرخي العضلة عند حقنه فيها.

العضلة النافصة (Detrusor)

عضلة المثانة التي تُحقن بـ Botox.

منظار المثانة (Cystoscope)

الكاميرا الرفيعة المستخدمة لإيصال الحقن.

القسطرة الذاتية

إدخال أنبوب رفيع لتفريغ المثانة، وقد تكون مطلوبة مؤقتاً.

البول المتبقي بعد التبول

البول الباقي في المثانة بعد التبول، يُقاس بعد الإجراء.

هل سيؤلم؟ يُوضع مخدّر في المثانة أولاً، فيشعر معظم المرضى بضغط خفيف فحسب أثناء الحقن السريع. يُجرى الإجراء عادةً في العيادة تحت التخدير الموضعي ويستغرق نحو 10-15 دقيقة، ثم تعود إلى البيت مباشرةً.

كيف تستعدّ

- فحص البول قبل الإجراء للتحقق من خلوه من العدوى.
- قد تُعطى مضاداً حيوياً قبيل الإجراء أو بعده.
- أخبر فريقك الطبي عن مميّعات الدم، وكن مستعداً لتعلّم القسطرة الذاتية احتياطاً.

ما الذي يحدث

- 1 يُوضع سائل مخدّر داخل المثانة.
- 2 يُمرّر منظار المثانة (Cystoscope) الرفيع عبر الإحليل.
- 3 يُحقن Botox في جدار المثانة في عدة نقاط صغيرة.
- 4 يُسحب المنظار — يستغرق الإجراء كله نحو 10-15 دقيقة.

بعد الإجراء

- حرقة خفيفة أو بول وردّي لبضعة أيام أمر طبيعي.
- يتراكم التحسّن خلال 1-2 أسبوع؛ يدوم المفعول نحو 6 أشهر ويمكن تكرار الحقن.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- عجز عن التبوّل أو شعور بعدم تفريغ المثانة
- حمّى أو قشعريرة (علامة محتملة على عدوى)
- نزيف غزير أو جلطات في البول
- حرقة تزداد سوءاً بعد أيام قليلة

معلومات مفيدة

- عادةً يُفحص تفريغ مثانتك بعد الإجراء.
- إن كانت الجرعات المتكررة مخططة، تُعطى بفواصل أشهر عدة.

ثلاثة أمور تنكّرها

1. يُرخي Bladder Botox عضلة المثانة المفرطة النشاط فيُخفّف الإلحاح وكثرة التبوّل وسلس البول؛ يعمل خلال 1-2 أسبوع ويدوم ~6 أشهر.
2. إجراء سريع في العيادة تحت تخدير موضعي؛ التأثير الجانبي الرئيسي هو احتمال الحاجة إلى قسطرة ذاتية مؤقتة.
3. اتصل بفريقك فوراً إذا عجزت عن التبوّل أو ظهرت حمّى بعد الإجراء.