

في إطار جراحتك الترميمية، يستخدم جراحك قطعة صغيرة من البطانة الرطبة لداخل خدك — وهي الطعم المخاطي الشدقي — لإعادة بناء الإحليل (مجرى البول)، أو في حالات أقل شيوعاً، الحالب (الأنبوب الواصل بين الكلية والمثانة). تشرح هذه النشرة سبب اختيار الخد، وما الذي يحدث، وكيف سيبدو فمك أثناء الشفاء.

عن هذا الإجراء

الجدار الداخلي للخد مبطن بنسيج رطب ومتين يُماثل أنسجة المسالك البولية تماماً. تُؤخذ قطعة بيضاوية رفيعة من خد واحد (وأحياناً من الاثنين معاً لإصلاح أطول)، وتُستخدم لتوسيع المنطقة الضيقة أو إعادة بنائها. يُؤخذ الطعم أثناء نومك التخديري، في أثناء العملية الجراحية ذاتها.

لماذا نختار الخد؟

- خالٍ من الشعر ومعتاد على البيئة الرطبة كالمسالك البولية
- متين، يشفى بسرعة مع ندبة نادرة، ويقاوم العدوى
- يُؤخذ خلال العملية نفسها — دون شق إضافي في الجسم ودون ندبة ظاهرة

هل هو آمن؟

نعم. أخذ طعم الخد أسلوبٌ راسخ ومتحمّل جيداً في جراحة الإحليل، مع رضا مرتفع للغاية بين المرضى. يبتعد الجراح عن القناة التي تصرف اللعاب وعن زاوية الفم. معظم الآثار تخصن الفم، وتشمل: ألم، وتوتر، أو تخدر، وتتحسن خلال أسبوع أو أسبوعين. أخذ الطعم من الخدين يسبب ألماً أشد، لذا يُلجأ إليه فقط عند الحاجة لإصلاح أطول.

تعلم المصطلحات

الغشاء المخاطي الشدقي

البطانة الرطبة لداخل الخد.

الطعم (Graft)

قطعة من نسيجك الخاص تُنقل لإصلاح منطقة أخرى.

الإحليل (مجرى البول)

الأنبوب الذي يُخرج البول من الجسم.

رأب الإحليل (Urethroplasty)

جراحة لإصلاح الإحليل أو إعادة بنائه؛ يُعد الطعم الشدقي جزءاً منها.

موضع الماتح

المكان الذي أخذ منه الطعم — هنا: داخل الخد.

التخدير العام

دواء يُغيبك نائماً وخالياً من الألم طوال الجراحة.

قناة اللعاب (النكفية)

فتحة صغيرة داخل الخد تصرف اللعاب؛ يتجنبها الجراح.

تيبس الفك (Trismus)

صعوبة مؤقتة في فتح الفم على نطاق واسع؛ تتحسن مع تمارين التمدد اللطيف.

هل سيؤلم؟ يُؤخذ الطعم أثناء نومك تحت التخدير العام، فلا تشعر بشيء خلال الجراحة. بعد ذلك سيكون الخد مؤلماً — كآلم عضنة أو قرحة فموية — وقد تشعر بتوتر أو تخدر. يتحسن الألم خلال 1-2 أسبوع، ويستمر الخد في الشفاء خلال الأسابيع التالية. معظم المرضى يشربون السوائل في غضون يوم ويعودون للأكل الطبيعي في غضون أسبوع.

كيف تستعد (قبل الجراحة)

- يُؤخذ الطعم خلال الجراحة الترميمية تحت التخدير العام — اتبع جميع تعليمات الجراحة المعتادة (الصيام وإيقاف بعض الأدوية).
- اعتن بفمك قبل الجراحة — نظف أسنانك واشطف فمك جيداً؛ قد يطلب فريقك تنظيف أسنان احترافياً أولاً.
- لا تدخن ولا تستخدم التبغ — يُعطى شفاء الفم والطعم. الإقلاع قبل الجراحة يفيد كثيراً.

أخبر فريقك مسبقاً إذا:

- أجريت جراحة سابقة للفم أو الخد أو الفك، أو تلقيت إشعاعاً للرأس أو الرقبة
- لديك حالة فموية، أو صعوبة في فتح فمك على نطاق واسع
- تمضغ التبغ أو جوزة الببتل، أو لديك مشكلات أسنان مستمرة

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

- 1 أنت نائم تحت التخدير العام طوال العملية، ويُفتح فمك بلطف.
- 2 يزيل الجراح قطعة بيضاوية رفيعة من بطانة خد واحد (من الخدين في حالة الإصلاح الأطول)، مبتعداً عن قناة اللعاب وزاوية الفم.
- 3 يُشكل الطعم ويُستخدم لتوسيع المنطقة الضيقة أو إعادة بناء الجزء المصاب من المسالك البولية.
- 4 يُترك الخد عادةً ليشفى من تلقاء نفسه، أو يُغلق بغرز قابلة للدوبان.

بعد الجراحة (فمك)

- الشفاء على مرحلتين: يتحسن الألم والتوتر خلال 1-2 أسبوع، لكن الخد يستمر في الشفاء نحو شهر، والتخدر قد يستغرق شهراً أو أكثر حتى يزول تماماً.
- تناول أطعمة طرية خفيفة في البداية؛ تجنب الحار والحامض والساخن جداً والمقرمش والكحول. اشطف فمك بلطف بعد الأكل.
- مدد فمك بلطف يومياً لتخفيف التوتر. لا توجد ندبة ظاهرة — الطعم داخل فمك.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة
- نزيف غزير أو مستمر من الفم
- تفاقم ألم الفم أو التورم أو القيح (عدوى)
- عجز عن شرب السوائل أو فتح الفم كلياً

ثلاثة أمور تذكرها

1. قطعة صغيرة من البطانة الرطبة لداخل خدك تُستخدم لإعادة بناء الإحليل — خالية من الشعر، تشفى جيداً، ولا تترك ندبة ظاهرة.
2. تُؤخذ أثناء نومك في العملية ذاتها. للتحضير: اتبع تعليمات الصيام والدواء، اعتن بفمك، وأقلع عن التدخين.
3. سيكون خدك مؤلماً ومتوتراً أو مخدراً — يتحسن خلال 1-2 أسبوع لكنه يحتاج شهراً أو أكثر للشفاء الكامل. تناول أطعمة طرية، اشطف بلطف، ومزّن فمك يومياً. اتصل للإبلاغ عن الحمى أو النزيف الغزير أو التورم المتفاقم.