

Beta-3 Agonists (para sa Overactive Bladder)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Bagong gamot sa pantog na may mas kaunting side effect

Ang beta-3 agonists ay isang bagong uri ng gamot para sa **overactive bladder (OAB)** — biglaang pangangailangang umihi, madalas na pag-ihi, at hindi makontrol na pag-ihi. Ginagawa nitong mas maluwag ang pantog para makapag-imbak ng mas maraming ihi, at may **mas kaunting dry mouth, konstipasyon, at problema sa memorya** kumpara sa mga lumang anticholinergics. Ang dalawa sa klase na ito ay **mirabegron (Myrbetriq)** at **vibegron (Gemtesa)**.

Paano Ito Gumagana

Binubuksan nito ang **beta-3 receptors** sa dingding ng pantog, na nagpapaluwag sa **kalamnan ng pantog** habang napupuno ito. Sa mas marela na pantog habang iniimbak ang ihi, mas kaunti ang biglaang pagnanais at mas kaunting beses na pumunta sa CR — sa pamamagitan ng ibang paraan kaysa sa anticholinergics.

Ano ang Maaasahan

- Unti-unting nagbubunga sa loob ng **ilang linggo**; inumin **isang beses sa isang araw**.
- Karaniwang **well tolerated** — kaunti o walang dry mouth.
- Magandang pagpipilian para sa **mga nakatatanda** o sa sinumang nakaranas ng dry mouth o iba pang side effect mula sa anticholinergics.
- Maaari minsan na pagsamahin sa anticholinergic para sa mga stubborn na sintomas.

MGA TERMINO

Overactive bladder (OAB)

Biglaang pangangailangang umihi at madalas na pag-ihi dahil sa pantog na sumusukol nang maaga.

Beta-3 agonist

Gamot na nagpaparela ng pantog sa pamamagitan ng beta-3 receptors.

Mirabegron / vibegron

Ang dalawang gamot sa klase na ito.

Anticholinergic

Ang lumang uri ng gamot sa OAB; iniwasan ng beta-3 agonists ang marami sa mga side effect nito.

Presyon ng dugo

Maaaring bahagyang itaas ng mirabegron — sinusubaybayan ito.

BAKIT ITO PIPILIIN KAYSA SA MGA LUMANG GAMOT? Ang beta-3 agonists ay halos kasing epekto ng anticholinergics para sa overactive bladder ngunit may **mas kaunting dry mouth at konstipasyon**, at walang pangamba sa memorya — kaya madalas itong mas pinipili, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang pangunahing babantayan ay ang presyon ng dugo.

Paano Inumin

- Inumin **isang beses sa isang araw** ayon sa tagubilin; bigyan ng ilang linggo para magbisa.
- Pagsamahin sa bladder training at pelvic floor exercises (Kegel) para sa pinakamabuting resulta.
- Ituloy ang follow-up para masuri ng inyong care team ang epekto at ang presyon ng dugo.

Mahahalagang Paalala sa Kaligtasan

- **Maaaring itaas ng mirabegron ang presyon ng dugo** — sinusubaybayan ito, at hindi ito inirerekomenda kung napakataas o hindi kontrolado ang presyon ng dugo. (Ang vibegron ay halos walang epekto sa presyon ng dugo.)
- Sabihin sa inyong care team ang lahat ng gamot na iniinom — maaaring maapektuhan ng mirabegron ang antas ng ilang gamot.
- Tulad ng anumang gamot para sa OAB, iulat kung nahihirapan kayong umihi.

Mga Side Effect

- Karaniwang banayad — sakit ng ulo, baradong ilong
- Pagtaas ng presyon ng dugo (pangunahin sa mirabegron)
- Impeksiyon sa ihi (UTI), o kaunting konstipasyon

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Napakataas na presyon ng dugo**, o matinding sakit ng ulo
- **Hindi makapag-ih**i o pakiramdam na hindi kumukubos ang pantog
- Pamamaga ng mukha, labi, o dila, o hirap sa paghinga (bihirang allergy) — pumunta agad sa emergency

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Pinaparela ng beta-3 agonists ang pantog para mabawasan ang sintomas ng OAB, na may **mas kaunting dry mouth** kaysa sa mga lumang gamot.
2. Madalas na angkop para sa mga nakatatanda o pagkatapos makaranas ng side effect sa anticholinergics; bigyan ng ilang linggo.
3. Maaaring itaas ng mirabegron ang presyon ng dugo — huwag palaktawin ang check-up. Tumawag kung hindi kayo makapag-ih o tumaas nang biglaan ang presyon ng dugo.