

Bladder Botox (para sa Kontrol ng Pantog)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Mga iniksyon na nagpaparela ng overactive bladder

Ang Bladder Botox ay lunas para sa **overactive bladder** — biglaang pangangailangang umihi, madalas na pag-ihi, at hindi makontrol na pag-ihi — na hindi pa sapat na nagpabuti sa mga pagbabago sa pamumuhay at gamot. Ang maliliit na halaga ng botulinum toxin (Botox) ay ini-inject sa kalamnan ng pantog sa pamamagitan ng maliit na camera. Ang epekto ay nararamdaman sa loob ng 1–2 linggo at karaniwang tumatagal ng 6 na buwan.

Paano Ito Gumagana

Ang overactive bladder ay kusang-kilos na kumukontrata nang hindi dapat. Ang Botox ay **nagpaparela ng kalamnan** ng pantog, kaya titigil ito sa hindi kontroladong pag-kontrata — binabawasan ang biglaang pangangailangang umihi, madalas na pag-ihi, at pagtagas. Hindi ito agad gumagawa; mapapansin ninyo ang pagbabago sa loob ng **1–2 linggo**.

Ligtas Ba Ito?

Oo, ito ay kilala at napatunayan na. Ang pinakamahalagang dapat malaman: dahil nagpaparela ang Botox ng pantog, maaaring maging mas **mahirap na ganap na maubusan ng ihi** para sa ilang tao — kailangan ng kakaunting bilang na gumawa ng **pansamantalang sariling pag-catheter** hangga't hindi pa nawawala ang epekto. Kaya naman, dapat kayong handang matuto ng sariling pag-catheter kung kinakailangan. Kasama rin sa mga side effect ang impeksiyon sa ihi at panandaliang dugo sa ihi.

MGA TERMINO

Overactive bladder

Biglaang pangangailangang umihi at madalas na pag-ihi dahil sa maagang pag-kontrata ng pantog.

Botulinum toxin (Botox)

Gamot na nagpaparela ng kalamnan kapag ini-inject.

Detrusor

Ang kalamnan ng pantog na ini-inject.

Cystoscope

Ang manipis na camera na ginagamit para maihatid ang mga iniksyon.

Sariling pag-catheter

Pagpapasok ng manipis na tubo upang maubos ang pantog, minsan kailangan nang pansamantala.

Post-void residual

Ihi na natitira pagkatapos umihi — sinusuri pagkatapos ng pamamaraan.

MASAKIT BA? Nilalagyan muna ng panumbing na gamot ang pantog, kaya karamihan ay nararamdaman lamang ang banayad na presyon habang isinasagawa ang mabilis na mga iniksyon. Ito ay karaniwang **opisina na pamamaraan sa ilalim ng local anesthesia**, tumatagal ng mga 10–15 minuto, at makakauwi kayo agad pagkatapos.

Paano Maghanda

- Isang **pagsusuri ng ihi** bago ang pamamaraan upang matiyak walang impeksiyon.
- Maaaring bigyan kayo ng **antibiotic** bago o pagkatapos ng pamamaraan.
- Ipaalam sa inyong care team ang tungkol sa mga **blood thinner**, at maging handa sa pag-aaral ng sariling pag-catheter kung sakali.

Ano ang Nangyayari

- 1 Inilalagay ang panumbing na likido sa pantog.
- 2 Isang manipis na **cystoscope** ang ipinapasok sa urethra.
- 3 Ini-inject ang Botox sa dingding ng pantog sa ilang maliliit na lugar.
- 4 Inaalis ang camera — ang buong pamamaraan ay tatagal ng mga 10–15 minuto.

Pagkatapos

- Normal ang banayad na hapdi o kaunting dugo sa ihi sa loob ng isa o dalawang araw.
- Ang pagbabuti ay nararamdaman sa 1–2 linggo; ang benepisyo ay tatagal ng halos 6 na buwan at maaaring **ulitin**.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hindi kayo makaihi** (retention) o pakiramdam na hindi kayo ganap na nauubos
- Lagnat o pangiginig (posibleng impeksiyon)
- Matinding pagdurugo o mga kluto sa ihi
- Hapdi na lumala pagkatapos ng ilang araw

Mahalagang Malaman

- Karaniwang **sinusuri** ang inyong pag-ubos ng ihi pagkatapos ng pamamaraan.
- Kung planong ulitin ang iniksyon, ilang buwan ang agwat sa bawat dosis.

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang Bladder Botox ay nagpaparela ng overactive bladder, binabawasan ang biglaang pangangailangang umihi, madalas na pag-ihing, at pagtagas; gumagana ito sa loob ng 1–2 linggo at tumatagal ng ~6 na buwan.
2. Ito ay mabilis na pamamaraan sa opisina na may panumbing; ang pangunahing trade-off ay kailangan ng ilang tao ng pansamantalang sariling pag-catheter.
3. Tumawag agad kung hindi kayo makaihi o nagkakaroon ng lagnat pagkatapos ng pamamaraan.