

Buccal Mucosa (Loob ng Pisngi) Graft

Impormasyon para sa Pasyente · Ang graft mula sa pisngi para itayo muli ang inyong urethra o ureter

WARWIKI

Bilang bahagi ng inyong reconstructive surgery, gumagamit ang inyong siruhano ng maliit na piraso ng malambot na lining mula sa loob ng inyong pisngi — ang tinatawag na buccal mucosa graft (loob ng pisngi) — para itayo muli ang urethra (o, minsan, ang ureter, ang tubo mula sa bato papunta sa pantog). Ipinapaliwanag ng handout na ito kung bakit ginagamit ang pisngi, ano ang mangyayari, at paano mararamdaman at gagaling ang inyong bibig.

Tungkol sa Graft na Ito

Ang loob ng pisngi ay natatakpan ng matibay at malambot na tissue na angkop para sa urinary tract. Isang manipis na oval na piraso ang kinukuha mula sa isang pisngi (minsan sa dalawa, para sa mas mahabang pag-aayos) at ginagamit para palawakin o itayo muli ang may problema. Kinukuha ang graft **habang kayo ay natutulog, sa panahon ng parehong operasyon** ng inyong pag-aayos.

Bakit ginagamit ang loob ng pisngi?

- Walang buhok at sanay sa mamasa-masang kapaligiran, tulad ng urinary tract
- Matibay, mabilis gumaling nang walang malaking peklát, at lumalaban sa impeksiyon
- Kinukuha sa parehong operasyon — walang karagdagang hiwa sa katawan, at walang nakikitang peklát

Ligtas Ba Ito?

Oo. Ang pagkuha ng cheek graft ay kilala at tinatanggap na bahagi ng urethral surgery, na may napakataas na kasiyahan ng mga pasyente. Iniiwasan ng inyong siruhano ang duct ng laway at ang sulok ng bibig. Karaniwang nararamdaman ng pasyente ang pananakít, pagiging mahigpit, o pamamanhid sa bibig — at bumubuti ito sa loob ng unang ilang linggo. Ang pagkuha mula sa dalawang pisngi ay nagdudulot ng mas maraming pangangakit, kaya ginagawa lamang ito kung kinakailangan ng mas mahabang pag-aayos.

MGA TERMINO

Buccal mucosa

Ang malambot na lining sa loob ng pisngi.

Graft

Isang piraso ng sarili ninyong tissue na inilipat para ayusin ang ibang bahagi.

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan.

Urethroplasty

Operasyon para ayusin o itayo muli ang urethra; bahagi nito ang cheek graft.

Donor site (pinagkunan)

Ang lugar kung saan kinuha ang graft — dito, ang loob ng pisngi.

General anesthesia

Gamot na nagpapatulog at nag-aalis ng sakit sa panahon ng operasyon.

Saliva (parotid) duct

Maliit na bukas sa loob ng pisngi na nagpapalabas ng laway; iniiwasan ng siruhano.

Trismus

Pansamantalang paghihirap na buksan nang malawak ang bibig; bumubuti sa mahinang pag-eehersisyo.

MASAKIT BA? Kinukuha ang graft habang natutulog kayo sa general anesthesia, kaya wala kayong nararamdaman. Pagkatapos, masakit ang pisngi — parang nakagat o may singaw — at maaaring mahigpit o manhid. Bumubuti ito sa 1–2 linggo; karamihan ay nakakain nang normal sa loob ng isang linggo.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Kinukuha ang graft sa inyong reconstructive surgery, **sa general anesthesia** — sundin ang karaniwang tagubilin bago mag-opera (pag-aayuno, gamot na ihihinto).
- Alagaan ang inyong bibig** bago ang operasyon — magsepilyo at magmumog nang mabuti; maaaring hilingin ng inyong care team na magpa-linis ng ngipin muna.
- Huwag manigarilyo, mag-vape, o gumamit ng tabako** — nagpapabagal ito sa paggaling ng bibig at ng graft. Ang paghinto bago mag-opera ay malaking tulong.

Sabihin sa inyong care team **nang maaga** kung kayo ay:

- Naoperahan na sa bibig, pisngi, o panga, o natanggap ng radiation sa ulo o leeg
- May kondisyon sa bibig, o nahahirapan buksan nang malawak ang bibig
- Ngumuguya ng tabako o betel nut, o may patuloy na problema sa ngipin

Ano ang Nangyayari sa Operasyon

- 1 Natutulog kayo sa ilalim ng general anesthesia sa buong operasyon, at maingat na binubuksan ang inyong bibig.
- 2 Nag-aalis ang siruhano ng manipis na piraso ng lining mula sa isang pisngi (sa dalawa kung mas mahaba), iniawasan ang saliva duct at sulok ng bibig.
- 3 Hinuhubog ang graft at ginagamit para palawakin o itayo muli ang may pagsikip sa inyong urinary tract.
- 4 Karaniwang iniwan ang pisngi para gumaling nang kusa, o tinatahiin ng dissolvable stitches.

Pagkatapos ng Operasyon (Ang Inyong Bibig)

- Ang sakit at higpit ay **bumubuti sa unang 1–2 linggo**; patuloy gumagaling ang pisngi nang mga isang buwan, at **ang pamamanhid ay maaaring tumagal nang higit pa**.
- Kumain muna ng **malambot na pagkain**; iwasan ang maanghang, maasim, mainit, malutong, at alak.
- Araw-araw na **ibukas nang malawak ang bibig** para mabawasan ang higpit. **Walang nakikitang peklat**.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o pangiginig
- Mabigat o tuluy-tuloy na pagdurugo mula sa bibig
- Lumalang na sakit, pamamaga, o nana sa bibig (impeksiyon)
- Hindi kayo makainom ng likido o hindi kayo makabukas ng bibig

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Isang maliit na piraso ng lining mula sa loob ng pisngi ang gumagawa muli ng urethra — walang buhok, mabilis gumaling, walang nakikitang peklat.
2. Kinukuha ito habang natutulog kayo sa urethral repair. Para maghanda: sundin ang tagubilin sa pag-aayuno at gamot, alagaan ang bibig, at huwag manigarilyo.
3. Ang pisngi ay magiging masakit, mahigpit, o manhid — **bumubuti sa 1–2 linggo ngunit tumatagal nang isang buwan o higit pa**. Kumain ng malambot, magmumog nang banayad, at mag-ehersisyo ng bibig araw-araw.