

Colpocleisis (Pagsasara ng Puki)

Impormasyon para sa Pasyente · Simpleng, matibay na operasyon para sa pelvic organ prolapse na nagsasara ng puki

WARWIKI

Ang colpocleisis (pagsasara ng puki) ay isang napaka-epektibong, mababang-panganib na operasyon para sa pelvic organ prolapse (pagbaba ng organ). Gumagana ito sa pamamagitan ng **pagsasara ng karamihan sa vaginal canal** upang permanenteng itaas at hawakan ang mga organ. Dahil sinasara nito ang puki (vagina), pinipili ito ng mga babaeng tiyak na hindi na nais magkaroon ng pakikipagtalik sa puki (sexual intercourse) sa hinaharap. Mabilis ang operasyon, magaan sa katawan, at napaka-matagumpay — isang mahusay na pagpipilian, lalo na sa mas matatandang babae o sa mga may ibang problema sa kalusugan.

Tungkol sa Operasyong Ito

Sa halip na muling buuin ang suporta, ang colpocleisis ay **nag-aalis ng isang strip ng lining ng puki at tinatahing magkasama ang mga dingding**, pinaikli at sinasara ang canal upang hindi na mahulog ang mga organ. Maaaring gawin ito habang nandoon pa ang matris (uterus) o pagkatapos nitong matanggal. Dahil iniwasan nito ang mahabang rekonstruksiyon, mas mabilis at mas mababang-panganib kaysa sa ibang operasyon para sa prolapse, na may tagumpay na higit sa **90%**.

Ang Mahalagang Desisyon

Ang isang mahalagang punto: pagkatapos ng colpocleisis, **hindi na posible ang pakikipagtalik sa puki**, at permanente ang pagbabagong ito. Para sa mga taong tiyak na tungkol dito, napakataas ng kasiyahan. Tiyakin ng inyong care team na ito ang tamang pagpipilian at walang ibang alalahanin (tulad ng pangangailangan na suriin ang matris) bago magpatuloy.

MGA TERMINO

Prolapse

Kapag bumaba ang mga organ sa pelvis at nagdudulot ng bulge o presyon.

Colpocleisis

Operasyong nagsasara ng karamihan sa vaginal canal upang suportahan ang mga organ.

Obliterative surgery

Isang pag-aayos na nagsasara (sa halip na muling nagtatayo) ng puki.

LeFort

Isang uri ng colpocleisis na ginagawa habang nandoon pa ang matris.

Sling

Suporta na minsan ay idinaragdag nang sabay para sa pagtagas ng ihi.

MASAKIT BA? Ang operasyon ay isinasagawa sa ilalim ng anesthesia (kadalasan spinal o general), kaya wala kayong nararamdamang sakit habang ginagawa ito, at karaniwang maikli ang operasyon. Pagkatapos, karamihan ay may banayad na discomfort lamang at mabilis ang paggaling — isa sa mga pinakamadaling paggaling sa mga operasyon para sa prolapse.

Paano Maghanda

- Maging **tiyak sa desisyon** na hindi magkakaroon ng pakikipagtalik sa puki.
- Sundin ang mga tagubilin para sa **anesthesia** (pag-aayuno, ihinto ang blood thinners kung sinabi).
- Pre-op na pagsusuri; minsan ay **idinaragdag ang sling** kung nagtatago rin kayo ng ihi.
- Mag-ayos ng sasakyan at ng tulong sa bahay.

Ano ang Nangyayari

- 1 Kayo ay nasa ilalim ng anesthesia; bibigyan ng antibiotics.
- 2 Tinatanggal ang mga strip ng lining ng puki at ang mga dingding ay **tinatahing magkasama**, sinasara ang canal.
- 3 Isang catheter at minsan ay vaginal pack ang inilalagay nang ilang sandali.

Pagkatapos ng Operasyon

- Kadalasan ay **pauwi sa araw din o isang gabing** pananatili; magaan ang paggaling.
- Catheter nang ilang sandali; normal ang kaunting spotting.
- **Iwasan ang mabigat na pagbubuhat at pagpupwersa** ng ilang linggo; gamutin ang konstipasyon.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Matinding pagdurugo
- **Hindi kayo makapagihi** pagkatapos matanggal ang catheter
- Lumalang na sakit sa pelvis

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang colpocleisis ay nagsasara ng karamihan ng puki para suportahan ang prolapse — mabilis, napaka-matibay, at perpekto kapag gusto ninyo ng simple at mababang-panganib na pag-aayos.
2. Permanente ang kapalit: **hindi na posible ang pakikipagtalik sa puki** — kaya ito ay para sa mga tiyak na tungkol doon.
3. Karaniwang madali ang paggaling. Iwasan ang pagpupwersa, at tumawag para sa lagnat, matinding pagdurugo, o problema sa pag-ihing.