

Continent Cutaneous Diversion (Indiana Pouch)

Impormasyon para sa Pasyente · Isang panloob na supot na binubuksan gamit ang catheter — walang bag

WARWIKI

Ang continent cutaneous diversion ay isang panloob na reservoir (supot) na gawa mula sa sariling bituka ng pasyente na nag-iimbak ng ihi sa loob ng katawan, na may maliit at hindi tumatakbong bukas (stoma, madalas nasa pusod). Sa halip na magsuot ng bag, binubuksan ninyo ang supot sa pamamagitan ng pagpasok ng catheter sa bukas nang ilang beses sa isang araw. Ang Indiana pouch ang pinakakaraniwang uri.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Isang piraso ng **malaki at maliit na bituka** ang hinuhubog bilang mababang presyong **reservoir** sa loob ng tiyan; ang mga ureter (tubo mula sa bato) ay nakonekta rito. Isang maikling daanan na may **one-way valve** ay dinala sa balat — kadalasan ang **pusod** — bilang maliit at patag na stoma na tuyo sa pagitan ng mga catheterization.

- Nagpapasok kayo ng catheter para alisan ng ihi ang supot tuwing **4–6 na oras**.
- **Flushing (irrigation)** ng supot para alisin ang mucus.
- **Walang bag** — maliit na pad o bandage lang sa stoma.

Ito ay magandang pagpipilian para sa mga ayaw ng bag, hindi angkop sa (o ayaw ng) neobladder, at kayang **mag-catheter nang regular** — nangangailangan ng matatag na kamay at paningin, o isang tagapag-alaga na makakatulong.

Ligtas Ba Ito?

Ito ay isang kilalang continent na pagpipilian. Mas malaki at mas matagal itong operasyon kaysa sa conduit, at nangangailangan ng catheterization habambuhay. Kasama sa mga panganib: pagdurugo, impeksiyon, tagas, hirap sa pagpasok ng catheter o pagsikip/pagtagas ng stoma (maaaring mangailangan ng karagdagang pamamaraan), bato sa supot, mucus, impeksiyon sa ihi, at pangmatagalang pagbabago sa asin/bitamina/bato na sinusubaybayan sa follow-up.

MGA TERMINO

Continent diversion

Sistema ng ihi na hindi tumatakbo — kayo ang nagkokontrol kung kailan ito maubos.

Indiana pouch

Ang pinakakaraniwang continent pouch, gawa mula sa kanang colon at maliit na bituka.

Reservoir (supot)

Ang panloob na supot, gawa mula sa bituka, na nagtatago ng ihi.

Stoma

Ang maliit na bukas sa balat (kadalasan pusod) na pinagdadaan ng catheter.

Catheterize

Ang pagpasok ng manipis na tubo sa stoma para alisan ng ihi ang supot.

Irrigate

Ang pag-flush ng supot gamit ang tubig para alisin ang mucus.

Ureters

Ang mga tubo na nagdadala ng ihi mula sa bato; nakonekta sa supot.

Mucus

Malagkit na likido na ginagawa ng bituka; ang pag-aalis nito ay bahagi ng pangangalaga.

MASAKIT BA? Ang operasyon ay sa ilalim ng general anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, asahan ang sakit sa tiyan, at ilang araw bago “gumising” ang bituka. Magigising kayo na may tubo sa supot (na nananatili nang mga 3–4 na linggo) na ifi-flush para alisin ang mucus. Nananatili sa ospital nang mga 5–8 na araw.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Isinasagawa sa ilalim ng **general anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin sa operasyon (pag-aayuno, ihinto ang blood thinners ayon sa utos). Maaaring kailanganin ang **bowel prep**.
- Pinaplano ng inyong care team ang lokasyon ng **stoma** (kadalasan pusod) at tiyakin na kayo — o isang tagapag-alaga — ay kayang pamahalaan ang **catheterization habambuhay**.
- Huwag manigarilyo**, at mag-ayos ng tulong sa bahay pagkatapos.

Sabihin sa inyong care team **nang maaga kung kayo ay:**

- Umiinom ng **blood thinner**, o may kasalukuyang impeksiyon
- May **sakit sa bituka**, problema sa bato, o anumang **hirap sa kamay o paningin** na nakakaapekto sa catheterization

Ano ang Nangyayari Habang Operasyon

- Matutulog kayo sa ilalim ng anesthesia at bibigyan ng antibiotics.
- Isang piraso ng bituka ang ihihiwalay at ang natitirang bituka ay muling ikokonekta.
- Ang bituka ay huhubog bilang supot, at isang catheterizable na daanan na may one-way valve ay dadalhin sa balat bilang stoma.
- Ang mga ureter ay ikokonekta; isang tubo sa supot at malambot na stents ay ilalagay habang ito ay gumagaling.

Pagkatapos ng Operasyon

- Uuwi kayo pagkatapos ng mga **5–8 na araw** na may **tubo sa supot nang ~3–4 na linggo**; i-flush ito nang regular para alisin ang mucus.
- Pagkatapos itanggal ang supot, **mag-catheter sa stoma tuwing 4–6 na oras** at mag-irrigate para alisin ang mucus.
- Ang stoma ay nananatiling **tuyo** — maliit na pad ang pantakip (walang bag).
- Normal ang mucus; uminom ng maraming likido; habambuhay na follow-up (vitamin B12). **Iwasan ang mabigat na pagbubuhat nang ~6 na linggo.**

Tawagan ang inyong care team o humingi agad ng tulong kung kayo ay:

- Hindi makapagpasok ng catheter o walang ihi** — kailangang maubos agad ang supot
- May lagnat o pangangatal
- May matinding sakit sa tiyan, pagsusuka, o **walang hangin o dumi**
- May matinding pagdurugo o mga clot na humaharap sa catheter, o pamumula o pagtagas sa sugat

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

- Ang continent cutaneous (Indiana) pouch ay nag-iimbak ng ihi sa loob ninyo, binubuksan gamit ang catheter sa maliit na stoma — walang bag.
- Mag-catheter sa stoma tuwing 4–6 na oras at i-flush para alisin ang mucus, habambuhay — mahalaga ang matatag na kamay at paningin (o tagapatulong).
- Maghanda sa pag-aayuno at bowel prep, huwag manigarilyo, at mag-ayos ng tulong.