

Ang cystogram ay isang maikling X-ray ng inyong pantog (bladder). Ang pantog ay dahan-dahang pinupuno ng espesyal na contrast dye sa pamamagitan ng catheter upang malinaw itong makita sa X-ray. Tinutulungan nito ang inyong siruhano na suriin kung maayos na naghilom ang isang reparo at hindi ito tumatagos, o hanapin ang isang tagas, abnormal na koneksyon, o pagbabalik-agos ng ihi sa bato.

Tungkol sa Pagsusuring Ito

Ang pantog ay karaniwang hindi malinaw na nakikita sa simpleng X-ray. Ang cystogram ay pinupuno ito ng **contrast dye** na lumalabas na puti sa X-ray, para masuri ang hugis ng pantog at kung paano nito tinatago at inilalabas ang likido. Maaaring mag-order ng cystogram ang inyong siruhano upang:

- Kumpirmahin na ang **reparo ay naghilom na** at walang tagas — kadalasan bago tanggalin ang catheter
- Hanapin ang isang **tagas** pagkatapos ng pinsala o operasyon
- Mahanap ang abnormal na koneksyon (isang **fistula**) sa pagitan ng pantog at ibang organ
- Suriin ang pagbabalik-agos ng ihi patungo sa mga bato (**reflux**)

Kung paano papasok ang dye ay depende sa inyong sitwasyon:

- Kung wala kayong **tubo**, maglalagay ng maliit na catheter para lamang sa pagsusuri.
- Kung mayroon na kayong **urethral catheter** o **suprapubic catheter**, ang dye ay karaniwang dadaan dito — hindi na kailangan ng bagong tubo.

Ligtas Ba Ito?

Oo. Ang cystogram ay isang karaniwan at mababang-peligrong pagsusuri. Maliit lamang ang dosis ng X-ray, at ang water-based na dye ay lumalabas sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Karamihan sa mga tao ay nakakaramdam lamang ng pagkapuno o banayad na presyon. Ang hindi karaniwang mga side effect — impeksiyon sa ihi, maikling susunog, o pamimilipit — ay kadalasang banayad at mabilis mawala.

MGA TERMINO

Cystogram

X-ray ng pantog na kinukuha habang ito ay pinupuno ng dye.

Pantog (Bladder)

Ang malambot na lalagyan ng ihi hanggang sa umihi kayo.

Contrast dye

Likido na lumalabas na puti sa X-ray para makita ang pantog.

Catheter

Manipis at malambot na tubo na ginagamit upang punan ng dye ang pantog.

Suprapubic catheter

Catheter na nagpapalabas ng ihi sa pantog sa pamamagitan ng ibabang tiyan; maaaring dumaan dito ang dye.

Fistula

Abnormal na koneksyon sa pagitan ng pantog at ibang organ na maaaring makita ng cystogram.

Reflux

Pagbabalik-agos ng ihi mula sa pantog patungo sa mga bato.

Voiding images

Karagdagang X-ray habang umihi, kapag kailangan.

MASAKIT BA? Karamihan sa mga tao ay nakakaramdam lamang ng pagkapuno o banayad na presyon habang napupuno ang pantog, hindi matinding sakit. Kung naglagay ng catheter para sa pagsusuri, maaaring maramdaman ang maikling susunog. Ang koponan ay maaaring magpabagal o tumigil anumang oras — sabihin lamang sa kanila. Karaniwang tumatagal ang pagsusuri ng mga 15–30 minuto.

Paano Maghanda (Bago ang Pagsusuri)

Napakakaunti ang dapat gawin upang maghanda. Sa karamihang kaso:

- Maaari kayong **kumain at uminom nang normal** at inumin ang inyong **karaniwang gamot** maliban kung sinabihan nang iba.
- Kung mayroon kayong catheter o suprapubic catheter, **iwanan ito** — kadalasan ay dadaan dito ang dye.
- Maaari kayong karaniwang **magmaneho pauwi**, dahil hindi kailangan ng sedation.

Sabihin sa inyong koponan nang maaga kung kayo ay:

- Nakaranas na ng reaksiyon sa contrast dye o iodine
- Umiinom ng blood thinner
- May sintomas ng impeksiyon sa ihi (susunog, lagnat, o maulap at mabahong ihi) — maaaring ipagpaliban ang pagsusuri kung may aktibong impeksiyon

Ano ang Nangyayari sa Panahon ng Pagsusuri

- 1 Mahihiga kayo sa X-ray table. Kung wala pa kayong tubo, dahan-dahang maglalagay ng maliit na catheter; kung mayroon na, ikokonekta ito.
- 2 Dahan-dahang ipapasok ang dye sa pantog habang kinukuha ang mga X-ray. Maaaring hilingin sa inyo na tumigil sandali at huminga nang normal.
- 3 Maaaring hilingin sa inyo na **umihi** upang makuha ng koponan ang mga larawan ng pantog habang ito ay nagpapalabas (kapag ito ay bahagi ng pagsusuri).
- 4 Susuriin ang mga larawan at aalisin ang catheter — o iiwanan ang inyong kasalukuyang tubo.

Pagkatapos ng Pagsusuri

- Karaniwang maaari kayong umuwi at bumalik sa **normal na gawain agad**.
- Maaari kayong makaramdam ng **banayad na susunog sa pag-ih** sa loob ng isang araw. Ang pag-inom ng dagdag na tubig ay nakakatulong at nagpapababa nito.
- Maaari kayong mapansin ang **bahagyang pink** sa inyong ihi sa maikling panahon. Ito ay karaniwan at kadalasang nawawala sa loob ng isang araw.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Hirap sa pag-ih, o hindi talaga makaihi
- Matinding pagdurugo, o mga namuong dugo sa ihi
- Sakit o pamimilit sa tiyan na lumala sa halip na gumaling

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang cystogram ay isang mabilis at ligtas na X-ray na pinupuno ang pantog ng espesyal na dye — sinusuri nito kung naghilom ang isang reparo o naghahanap ng tagas, fistula, o reflux.
2. Kaunti lamang ang paghahanda. Iwanan ang anumang catheter o suprapubic catheter, at sabihin sa inyong koponan ang anumang allergy sa dye, blood thinner, o tanda ng impeksiyon sa ihi.
3. Karamihan ay nakakaramdam lamang ng pagkapuno at agad na nakakauwi. Ang banayad na susunog o kaunting pink sa ihi sa loob ng isang araw ay normal — uminom ng dagdag na tubig.