

Ингибиторы PDE5 (Таблетки при ED и проблемах простаты)

Информация для пациента · Таблетки при эректильной дисфункции — и симптомах мочеиспускания при аденоме простаты

WARWIKI

Ингибиторы PDE5 — таблетки для лечения **эректильной дисфункции (ED)**; один из них (тадалафил) также облегчает симптомы мочеиспускания при **увеличенной простате**. Основные препараты: **силденафил (Viagra)**, **тадалафил (Cialis)**, **варденафил** и **аванафил**. Они помогают получить эрекцию в ответ на сексуальное возбуждение — сами по себе эрекцию не вызывают.

Как это действует

Эти препараты **расслабляют кровеносные сосуды** полового члена, позволяя крови поступать в ткани. Важно: они работают **только при сексуальном возбуждении** — таблетка не создаёт эрекцию автоматически. Тадалафил также расслабляет мышцы простаты и мочевого пузыря, поэтому небольшая ежедневная доза улучшает мочеиспускание.

Чего ожидать

- **Силденафил / варденафил / аванафил** действуют примерно через **30–60 минут** и сохраняют эффект несколько часов.
- **Тадалафил** действует дольше (до ~36 часов — вариант «на выходные») или принимается в **малой ежедневной дозе**.
- Жирная еда может **задержать** действие силденафила; тадалафил еда не влияет.
- Может потребоваться несколько попыток, чтобы подобрать нужную дозу и время приёма.

ТЕРМИНЫ

Ингибитор PDE5

Класс таблеток (силденафил, тадалафил и др.) для лечения ED.

Эректильная дисфункция (ED)

Затруднение с получением или сохранением эрекции, достаточной для полового акта.

Нитраты

Препараты от боли в сердце/груди, которые НЕЛЬЗЯ сочетать с этими таблетками.

По потребности vs. ежедневно

Принимается перед сексом или в малой дозе каждый день.

ВРН

Доброкачественная гиперплазия простаты (ВРН); тадалафил также устраняет связанные симптомы мочеиспускания.

Приапизм

Эрекция продолжительностью более 4 часов — неотложная медицинская ситуация.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО Никогда не принимайте эти таблетки вместе с **нитратами** (например, нитроглицерин или изосорбид при болях в груди) или с «попперами» (амилнитрит). Сочетание может вызвать **опасное, угрожающее жизни падение артериального давления**. Обязательно сообщайте каждому врачу, что вы принимаете ингибитор PDE5.

Как принимать

- Принимайте **по назначению** — перед сексом (по потребности) или ежедневно, в зависимости от рецепта.
- Силденафил по потребности принимайте **натощак или с лёгкой едой** для более быстрого эффекта.
- Не принимайте более одной дозы в сутки без согласования с врачом.

Важная безопасность

- **Никаких нитратов и попперов** — никогда (см. выше).
- Соблюдайте осторожность при приёме **альфа-блокаторов** и других препаратов от давления (суммарный эффект может вызвать головокружение) — врач скорректирует режим.
- При **серьёзных заболеваниях сердца** уточните у врача, можно ли вам заниматься сексом и принимать эти таблетки.
- Ограничьте употребление **алкоголя**: он усиливает головокружение.

Частые побочные эффекты

- Головная боль, **покраснение лица**, заложенность носа, расстройство желудка
- Боль в спине или мышцах (чаще при тадалафиле)
- Временное **синеватое восприятие цветов** (силденафил/варденафил)

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Эрекция продолжительностью **более 4 часов** (приапизм)
- **Внезапная потеря зрения или слуха** — прекратите приём и немедленно обратитесь за помощью
- **Боль в груди**, обморок или сильное головокружение

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Ингибиторы PDE5 помогают получить эрекцию **при возбуждении** (сами по себе не действуют); тадалафил также улучшает мочеиспускание при увеличенной простате.
2. **Никогда не сочетайте с нитратами или попперами** — падение давления может быть опасным для жизни.
3. При эрекции дольше 4 часов или внезапной потере зрения/слуха немедленно вызывайте скорую помощь.