

Упражнения для тазового дна & тренировка мочевого пузыря

WARWIKI

Информация для пациента · Простой, проверенный первый шаг при недержании и позывах

Два наиболее эффективных первых шага для улучшения контроля над мочевым пузырём не требуют ни лекарств, ни операции: **упражнения для мышц тазового дна** (часто называемые упражнениями Кегеля) укрепляют мышцы, удерживающие мочу, а **тренировка мочевого пузыря** постепенно увеличивает интервалы между походами в туалет. При регулярном выполнении они уменьшают стрессовое недержание, ургентность и учащённое мочеиспускание — и при этом совершенно бесплатны и безопасны.

Как это помогает

- **Упражнения для тазового дна** укрепляют мышечную поддержку под мочевым пузырём и уретрой, уменьшая подтекание при кашле, подъёме тяжестей или нагрузке — и помогают сдерживать позывы.
- **Тренировка мочевого пузыря** постепенно увеличивает интервал между посещениями туалета, успокаивая гиперактивный мочевой пузырь (ОАВ) и снижая частоту мочеиспусканий.

Как найти нужные мышцы

Мышцы тазового дна — это те, которые вы используете, чтобы **остановить поток мочи** или удержать газы. Сожмите и подтяните их, **не** напрягая живот, ягодицы или бёдра, и **не задерживая дыхание**. (Не практикуйтесь, реально останавливая мочеиспускание, — это только способ найти мышцы.) Если вы не можете их найти, **физиотерапевт, специализирующийся на тазовом дне**, может помочь, в том числе с помощью биологической обратной связи.

ТЕРМИНЫ

Тазовое дно

Группа мышц, поддерживающих мочевой пузырь, кишечник и (у женщин) матку.

Упражнения Кегеля

Упражнения на сжатие и подъём мышц тазового дна.

Тренировка мочевого пузыря

Постепенное увеличение интервала между походами в туалет.

Подавление позыва

Сдерживание внезапного позыва, чтобы добраться до туалета без подтекания.

Биологическая обратная связь

Инструмент, показывающий, правильно ли вы задействуете нужные мышцы.

Физиотерапия тазового дна

Терапевт, специализирующийся на этих мышцах.

КАК СКОРО БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ? Наберитесь терпения — большинство пациентов замечают улучшение примерно через **6–12 недель** регулярных занятий, и с продолжением тренировок оно нарастает. Как и при любых упражнениях, эффект ослабевает при отказе от них, поэтому цель — сделать их постоянной ежедневной привычкой.

Простая ежедневная программа

- 1 **Сожмите** мышцы тазового дна и удерживайте 3–5 секунд, затем полностью расслабьтесь на то же время.
- 2 Повторите около **10 раз**, выполняя **3 подхода в день**. Постепенно увеличивайте время удержания по мере укрепления.
- 3 Добавьте несколько **быстрых сильных сжатий** перед кашлем, чиханием или подъёмом тяжестей («приём»).
- 4 Полное расслабление между сжатиями так же важно, как само сжатие.

Тренировка мочевого пузыря

- Ведите краткий **дневник мочеиспусканий**, чтобы понять свой режим.
- При возникновении позыва **остановитесь, сожмите мышцы тазового дна, спокойно подышите и дождитесь, пока позыв ослабнет**, — затем спокойно направляйтесь в туалет.
- Постепенно увеличивайте интервал между посещениями туалета на 15 минут, стремясь к каждые 3–4 часа.

Полезно знать

- Упражнения можно делать **где угодно** — никто не заметит.
- Регулярность важнее интенсивности; привяжите их к ежедневным ориентирам (еда, ожидание на светофоре).
- При **боли в области таза** или чрезмерно напряжённых мышцах тазового дна целью может быть **расслабление**, а не укрепление — уточните у вашего врача.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Вы не можете понять, правильные ли мышцы задействуете
- Упражнения **усиливают боль** или давление
- Нет изменений после нескольких месяцев занятий

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Упражнения для тазового дна и тренировка мочевого пузыря — безопасный, бесплатный, проверенный первый шаг при недержании, ургентности и учащённом мочеиспускании.
2. Сжимайте нужные мышцы (не задерживая дыхание), полностью расслабляйтесь между сжатиями и приучайте мочевой пузырь ждать чуть дольше.
3. Занимайтесь 6–12 недель и не бросайте. Если боль усилилась или вы не можете найти мышцы — обратитесь за физиотерапией тазового дна.