

Тракционная терапия полового члена

Информация для пациента · Носимое устройство, мягко растягивающее ткань для уменьшения кривизны

WARWIKI

Тракционная терапия предполагает использование устройства, которое оказывает **мягкое, продолжительное растяжение** полового члена. Она применяется прежде всего при **болезни Пейрони** — для уменьшения кривизны и сохранения длины, а также для пенильной реабилитации, например после операции по установке протеза. Метод нехирургический и безопасный, однако эффективен только при **регулярном ежедневном применении на протяжении месяцев**.

Как это действует

Устойчивое мягкое натяжение способствует постепенному **ремоделированию** ткани и рубца (бляшки), что позволяет уменьшить кривизну и сохранить длину. Улучшение умеренное и постепенное — это медленная планомерная терапия, а не быстрое решение. Её часто сочетают с другими методами лечения болезни Пейрони.

Чего ожидать

- Устройство носят **определённое время каждый день** согласно инструкции к конкретной модели (одни носят дольше, другие применяют короткими сессиями несколько раз в день).
- Результат накапливается **в течение нескольких месяцев** — главное — постоянство.
- Наилучший эффект — в **активной фазе** болезни Пейрони или в сочетании с другими видами лечения.

ТЕРМИНЫ

Тракционная терапия

Использование устройства для мягкого растяжения полового члена с течением времени.

Болезнь Пейрони

Рубцовая ткань, вызывающая искривление полового члена — основное показание для тракции.

Бляшка

Рубцовая ткань, которую тракция помогает ремоделировать.

Пенильная реабилитация

Сохранение длины и функции, например после установки протеза.

Активная и стабильная фаза

Продолжается ли изменение кривизны при болезни Пейрони или стабилизировалась.

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГАЕТ? Да — результат **умеренный, но реальный**: уменьшение кривизны и сохранение длины, но только при добросовестном применении на протяжении месяцев. Думайте об этом как о физиотерапии: постепенно и зависит от постоянства. Самостоятельно выпрямить выраженную кривизну метод не способен; он хорошо сочетается с инъекциями или операцией.

Безопасное применение

- 1 Строго соблюдайте инструкцию по **времени ношения и натяжению** — не затягивайте слишком сильно.
- 2 Устройство надевают на расслабленный половой член; прекратите сеанс при **онемении, изменении цвета или боли**.
- 3 Увеличивайте время ношения постепенно, по мере привыкания.
- 4 Содержите устройство в чистоте и делайте перерывы согласно инструкции.

Полезно знать

- Устройство незаметно и используется дома; многие пациенты сочетают его с другими методами лечения болезни Пейрони.
- Оценивайте результат через месяцы, а не дни.
- Уточните у врача, какое устройство и режим применения рекомендуются именно вам.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Онемение** или холодный, бледный либо синюшный половой член, который не восстанавливается быстро
- Стойкая боль, повреждение кожи или ранки
- Нарастание кривизны или появление новых уплотнений

Частые явления

- Временное покраснение или следы в местах контакта устройства
- Лёгкий дискомфорт, который проходит по мере привыкания

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Тракционная терапия мягко растягивает половой член, уменьшая кривизну при болезни Пейрони и помогая сохранить длину — нехирургически и безопасно.
2. Эффективна только при **регулярном ежедневном применении на протяжении месяцев**; улучшение постепенное и умеренное, часто в сочетании с другими методами.
3. Никогда не затягивайте слишком сильно. При онемении, изменении цвета или стойкой боли прекратите использование и обратитесь к врачу.