

Чрескожная стимуляция большеберцового нерва (PTNS)

Информация для пациента · Мягкая нервная стимуляция в области лодыжки при гиперактивном мочевом пузыре

WARWIKI

PTNS — безлекарственный офисный метод лечения **гиперактивного мочевого пузыря (ОАВ)**: ургентных позывов, учащённого мочеиспускания и ургентного недержания. Тонкая игла у лодыжки подаёт слабые электрические импульсы на **большеберцовый нерв**, связанный с нервами, управляющими мочевым пузырём. Курс сеансов успокаивает патологические сигналы мочевого пузыря.

Как это действует

Большеберцовый нерв у внутренней лодыжки связан с теми же спинномозговыми нервами, что управляют мочевым пузырём. Его стимуляция посылает сигналы, которые **переобучают и успокаивают** гиперактивный мочевой пузырь — снижают ургентность и частоту мочеиспускания. Лекарства не требуются, системных побочных эффектов нет.

Подходит ли мне этот метод?

- Хороший выбор, когда изменения образа жизни недостаточны и вы хотите **избежать лекарств** или они вызывали побочные эффекты.
- Безлекарственный — подходит, если лекарства для мочевого пузыря противопоказаны.
- Требуется **регулярного посещения сеансов** для достижения и сохранения эффекта.

ТЕРМИНЫ

Гиперактивный мочевой пузырь

Ургентные позывы и учащённое мочеиспускание из-за преждевременных сокращений мочевого пузыря.

Большеберцовый нерв

Нерв у лодыжки, связанный с нервным снабжением мочевого пузыря.

Нейромодуляция

Применение слабых электрических сигналов для успокоения гиперактивных нервов.

Чрескожный

Через кожу — с помощью тонкой игольчатой электроды.

Поддерживающая терапия

Периодические сеансы для сохранения достигнутого эффекта.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Большинство пациентов ощущают лишь лёгкое покалывание, пульсацию или мягкое сгибание пальцев стопы — без боли. Каждый сеанс длится около **30 минут** в удобном положении сидя; после него можно сразу сесть за руль и вернуться к обычной жизни.

Что происходит

- 1 Вы сидите с опорой для ноги; **очень тонкая игольчатая электрода** вводится у внутренней лодыжки.
- 2 Небольшой аппарат подаёт **мягкие импульсы** около 30 минут.
- 3 Игла извлекается — между визитами ничего в теле не остаётся.

График лечения

- Обычно **один сеанс в неделю в течение 12 недель** в начале курса.
- Большинство пациентов с ответом на лечение затем проходят **периодические поддерживающие сеансы** для сохранения эффекта.
- В некоторых центрах доступен **имплантируемый** стимулятор большеберцового нерва для долгосрочной домашней стимуляции.

Важно знать

- Пройдите **полные 12 недель** — эффект нарастает постепенно.
- Никаких лекарств, операций и периода восстановления.
- Требуются продолжающиеся сеансы; без них эффект может ослабнуть.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Покраснение, отёк или выделения в области лодыжки после процедуры
- Повышение температуры или сильная боль в лодыжке после сеанса
- Симптомы со стороны мочевого пузыря внезапно усилились

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. PTNS успокаивает гиперактивный мочевой пузырь мягкой стимуляцией нерва у лодыжки — без лекарств и системных побочных эффектов.
2. Стандартный курс — 12 еженедельных сеансов по ~30 минут, затем поддерживающие визиты.
3. Завершите полный курс и планируйте поддерживающие сеансы, чтобы сохранить результат.