

Промежностная уретростомия

WARWIKI

Информация для пациента · Постоянное отверстие для мочи в промежности

Промежностная уретростомия — это операция, при которой создаётся постоянное отверстие для мочи в промежности (область между мошонкой и анусом). Она выполняется, когда уретра слишком сужена, покрыта рубцами или повреждена для восстановления. После операции вы мочитесь сидя через это отверстие, а не через кончик полового члена. В этом листке описано, как проводится операция и чего ожидать.

Об этой процедуре

Стриктура (сужение уретры) — это рубцово-суженный участок уретры, блокирующий отток мочи. Если сужение длинное, постоянно рецидивирует или уретра слишком повреждена для восстановления, хирург выводит **здоровый участок уретры** (позади сужения) к коже промежности и подшивает его, создавая постоянное широкое отверстие. Моча выходит через него.

Это **надёжное и долговечное** решение, позволяющее избежать длительных или повторных операций — хороший выбор при сложных стриктурах или нежелании переносить несколько вмешательств.

Что важно знать

Главное изменение: вы будете **мочиться сидя** через новое отверстие; моча больше не выходит через кончик полового члена. Большинство мужчин адаптируются без труда. **Половой член остаётся на месте** — чувствительность и оргазм обычно сохранены, эрекция у большинства также сохраняется (у некоторых возможны изменения). Со временем отверстие может **сузиться**; в этом случае небольшая процедура, как правило, восстанавливает его просвет.

ТЕРМИНЫ

Уретра

Трубка, по которой моча выводится из организма.

Стриктура

Рубцово-суженный участок уретры, блокирующий мочеиспускание.

Промежность

Область между мошонкой и анусом, где создаётся новое отверстие.

Промежностная уретростомия

Операция по формированию постоянного отверстия для мочи в промежности.

Стома

Новое отверстие, через которое выходит моча.

Сужение стомы

Постепенное уменьшение просвета нового отверстия — обычно устраняется небольшой процедурой.

Катетер

Мягкая трубка, оставляемая на 1–2 недели на время заживления.

Общая анестезия

Препараты, поддерживающие сон и отсутствие боли во время операции.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей или спинальной анестезией — во время неё вы ничего не чувствуете. После следует ожидать отёка, синяков и болезненности в промежности в течение 1–2 недель; помогают тёплые сидячие ванночки, лёд и обезболивающие. Во время операции устанавливается катетер. Многие пациенты выписываются в тот же день или после одной ночи.

Как подготовиться (до операции)

- Операция под **общей или спинальной анестезией** — соблюдайте все предоперационные инструкции (голодание, отмена препаратов, в том числе антикоагулянтов).
- Анализ мочи** исключает инфекцию (при наличии — лечится заранее); назначаются антибиотики. **Не курите** — курение замедляет заживление.
- Во время операции ноги удерживаются в держателях. Планируйте **катетер примерно на 1–2 недели** и организуйте транспорт домой.

Заранее сообщите врачу, если вы:

- Получали **лучевую терапию на таз** — риск сужения стомы выше
- Принимаете антикоагулянты или имеете текущую инфекцию

Что происходит во время операции

- 1 Вы погружены в сон или обездвижены анестезией, ноги зафиксированы; вводятся антибиотики.
- 2 Через разрез в промежности хирург обнажает здоровый участок уретры позади сужения и удаляет или обходит рубцовую часть.
- 3 Здоровая уретра выводится к коже и подшивается, формируя широкое новое отверстие; устанавливается катетер, рана закрывается.

После операции

- Ожидайте **отёк, синяки и болезненность** в промежности 1–2 недели. Помогают тёплые сидячие ванночки, лёд и обезболивающие.
- Катетер остаётся ~1–2 недели**, затем врач его удаляет. После этого вы мочитесь **сидя** через новое отверстие.
- Избегайте тяжестей, натуживания, велосипеда и секса** несколько недель; не сидите прямо на этой области.
- Если струя **со временем ослабевает**, возможно сужение стомы — сообщите врачу: небольшая процедура восстановит просвет.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Катетер выпал или перестал дренировать, либо вы **не можете помочиться** после его удаления
- Повышение температуры или озноб, нарастающее покраснение, боль, отёк или выделения из раны
- Обильное кровотечение

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Промежностная уретростомия создаёт постоянное отверстие для мочи в промежности — применяется при тяжёлом сужении или повреждении уретры. После неё вы мочитесь **сидя**.
2. Операция надёжна и долговечна, избавляет от повторных вмешательств. **Половой член остаётся на месте**; чувствительность, оргазм и обычно эрекция сохранены.
3. Катетер стоит ~1–2 недели. Отверстие может сузиться — сообщите врачу при ослаблении струи.