

ناسور العانة البولي هو اتصال غير طبيعي بين المسالك البولية (عق المثانة أو الإحليل) ومفصل عظمة العانة في مقدّمة الحوض — غالبًا مع عدوى في العظم. يسبّب ألمًا شديدًا في العانة والفخذ وصعوبة في المشي. وهو غير شائع لكنه خطير، وتوجد له خطة علاجية واضحة.

عن هذه الحالة

يؤدي تسرّب البول على عظمة العانة إلى التهاب العظم (التهاب العظم والنقي) وتدمير المفصل. تشمل الأعراض النموذجية:

- ألم شديد في العانة والفخذ والحوض، يزداد عادةً عند المشي
- صعوبة المشي أو تحمّل الوزن
- عدوى متكررة في المسالك البولية؛ وأحيانًا تسرّب البول

كثيرًا ما يُشخّص الألم خطأً في البداية على أنه التهاب مفاصل أو مشكلة عظمية، مما قد يؤخّر التشخيص الصحيح.

الأسباب

يُعَدّ هذا الناسور في الغالب مضاعفة متأخرة لعلاج سرطان البروستاتا — خاصةً العلاج الإشعاعي، وغالبًا بعد إجراء سابق على عق المثانة أو الإحليل. يشفى النسيج المُشعّع ببطء، مما يسمح للبول بالتآكل في العظم.

تعلم المصطلحات

ارتفاع العانة

المفصل الذي تلتقي فيه عظمتا العانة في مقدّمة الحوض.

ناسور العانة البولي

اتصال بين المسالك البولية وذلك المفصل أو العظم.

التهاب العظم والنقي

عدوى في العظم.

MRI

أفضل فحص تصويري لإظهار العظم والناصور.

التنضير الجراحي

إزالة العظم والنسيج المصاب جراحيًا.

تحويل مسار البول

إعادة توجيه البول بعيدًا عن المنطقة المتضررة، وغالبًا ما يكون الحلّ الدائم.

لماذا يُعالج بهذه القوة؟ لأن المشكلة تكمن في نسيج وعظم مصابين بعدوى ويشفيان بصعوبة (غالبًا بعد الإشعاع)، ونادرًا ما ينجح الترقيع البسيط. يتطلب الشفاء الدائم عادةً إزالة العظم المصاب وتحويل مسار البول بعيدًا عن المنطقة — لذلك يُوصى في الغالب بتحويل مسار البول. الجانب الإيجابي أنه قد ينهي سنواتٍ من الألم نهائيًا.

كيف تُشخص

معلومات مفيدة

- إذا كنت تعاني ألمًا غير مبرر في العانة بعد الإشعاع على البروستاتا، فأخبر فريقك الطبي — يسهل إغفال هذه الحالة.
- قد يبدو تحويل مسار البول مرهقًا، لكنه في الغالب ما يزيل الألم والعدوى نهائيًا.

- MRI للحوض (الأفضل لإظهار العظم) وتنظير الإحليل والمثانة
- مزارع لتحديد نوع العدوى
- تاريخ مرضي دقيق — علاج سرطان البروستاتا السابق والإشعاع والإجراءات السابقة

كيف تُعالج

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة أو شعور بوعكة شديدة (احتمال انتشار العدوى)
- تفاقم ألم العانة أو الفخذ أو عجز تام عن المشي
- تعذر التبول أو نزيف غزير

ثلاثة أمور تذكرها

1. يتسبب ناسور العانة البولي في تآكل البول لعظمة العانة، مما يسبب ألمًا شديدًا والتهاب العظم — غالبًا بعد سنوات من الإشعاع على البروستاتا.
2. كثيرًا ما يُخطئ في تشخيصه على أنه التهاب مفاصل؛ يُوضح MRI التشخيص. أخبر فريقك بأي إشعاع سابق.
3. يتضمن العلاج إزالة العظم المصاب وتحويل مسار البول في الغالب — وهو علاج مكثف لكنه يُنهي الألم نهائيًا.

1 المضادات الحيوية للتهاب العظم.

2 جراحة لإزالة العظم المصاب (التنضير) وتنظيف المنطقة.

3 تحويل مسار البول — يحتاج كثير من المرضى في نهاية المطاف إلى تحويل مسار البول (وأحيانًا إزالة المثانة أو الإحليل التالفين) لأن النسيج المُشعع لن يلتئم بخلاف ذلك.

4 رفع الجزء الرخو — قد يُستخدم عضلة صلبة أو ثرب لملء الفراغ وتعزيز الشفاء.

يكون العلاج عادةً متعدد التخصصات (المسالك البولية مع جراحة العظام و/أو الجراحة التجميلية).