

Sacrocolpopexy هي من أكثر العمليات ديمومةً لعلاج هبوط قمة المهبل أو الرحم. تُستخدم شبكة ناعمة لرفع قمة المهبل وتثبيتها في الرباط المتين فوق عظمة العجز، مما يُعيد الأعضاء إلى وضعها الطبيعي. تُجرى في الغالب بالجراحة بالمنظار (روبوتية أو بالمنظار العادي) وتحافظ على القدرة الجنسية.

عن هذه العملية

تُثبت قطعة من الشبكة في الجدار الأمامي والخلفي لقمة المهبل، ثم تُربط بالرباط المتين فوق عظمة العجز، فتُبقى المهبل في وضعه الطبيعي. تُعدّ هذه العملية المعيار الذهبي لعلاج هبوط القمة لديمومتها الطويلة.

عن الشبكة

تُوضع الشبكة عبر البطن ولها سجل أمان موثوق ومدروس. وهي **مختلفة تمامًا** عن الشبكة المهبليّة لهبوط الأعضاء التي صدرت بشأنها تحذيرات هيئة FDA وسُحبت من الأسواق. سيناقتش طبيبك المخاطر الطفيفة، بما فيها احتمال نادر لظهور الشبكة.

تعلم المصطلحات

القمة / القبة

أعلى المهبل، وقد يهبط بعد الولادة أو استئصال الرحم.

العجز

العظمة في قاعدة العمود الفقري؛ يُثبت الرباط فيها.

الشبكة

مادة دائمة ناعمة تدعم قمة المهبل.

روبوتي / بالمنظار

جراحة بثقوب صغيرة دون شق كبير.

ظهور الشبكة

مضاعفة غير شائعة تظهر فيها قطعة صغيرة من الشبكة؛ قابلة للعلاج.

استئصال الرحم

إزالة الرحم، وقد تُجرى في نفس الوقت.

هل سيؤلم؟ تُجرى العملية تحت التخدير العام فلا تشعر بشيء أثناءها. مع الجراحة بالمنظار، يعاني معظم المرضى من ألم خفيف في مواضع الثقوب وانزعاج من الغازات، ويعودون للمنزل في نفس اليوم أو بعد ليلة واحدة. الجراحة المفتوحة تستلزم فترة تعافٍ أطول قليلاً.

كيف تستعدّ

بعد الجراحة

- تُجرى تحت التخدير العام — اتبع تعليمات الصيام والدواء (أوقف مميعات الدم حسب التوجيهات).
- يُجرى تقييم قبل العملية؛ وقد تُدمج معها عملية استئصال الرحم و/أو تدخل لعلاج سلس البول.
- ألق عن التدخين؛ رتب من يوصلك ويساعدك في المنزل.
- العودة للمنزل في نفس اليوم أو بعد ليلة؛ نشاط خفيف في البداية.
- تجنب رفع الأثقال والإجهاد والجماع لنحو 6 أسابيع.
- بعض الإفرازات الدموية الخفيفة وعدم الراحة طبيعيان؛ عالج الإمساك.

ما الذي يحدث

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة
- نزيف غزير، أو تفاقم الألم في البطن أو الحوض
- عدم القدرة على التبول، أو غثيان/قيء مستمر
- إفرازات مهبلية ذات رائحة، أو ألم أثناء الجماع لاحقاً (قد يشير لمشكلة في الشبكة)

1 تكون نائماً؛ تُعطى المضادات الحيوية.

2 عبر ثقب صغيرة (أو شق مفتوح واحد)، تُثبت الشبكة في قمة المهبل.

3 تُربط الشبكة برباط العجز لرفع المهبل إلى مكانه.

4 تُوضع قسطرة لفترة قصيرة.

ثلاثة أمور تذكّرها

1. Sacrocolpopexy ترفع قمة المهبل بشبكة مثبتة في العجز — الأكثر ديمومةً لعلاج هبوط القمة، وتُجرى عادةً بالمنظار.
2. شبكتها البطنية مدروسة جيداً وتختلف عن الشبكة المهبلية المسحوبة.
3. تجنب رفع الأثقال والجماع لنحو 6 أسابيع. اتصل بطبيبك عند الحمى، النزيف الغزير، عدم التبول، أو ظهور رائحة/ألم لاحقاً.