

استئصال البروستاتا البسيط هو جراحة لعلاج تضخم البروستاتا الحميد الشديد (BPH) الذي يعيق تدفق البول. يُزيل الجراح الجزء الداخلي المتضخم من البروستاتا — الجزء المسبب للانسداد — عبر البطن، إما بجراحة مفتوحة أو بالمنظار الروبوتي. وهي فعّالة جداً للغدد الكبيرة.

فارق مهم

استئصال البروستاتا "البسيط" ليس هو "الاستئصال الجذري" لعلاج سرطان البروستاتا. الاستئصال الجذري يُزيل البروستاتا كاملةً لعلاج السرطان. أما الاستئصال البسيط فيُزيل فقط الأنسجة الداخلية المتضخمة الحميدة ويُبقى على الغلاف الخارجي — أي أنه يعالج الانسداد الناجم عن التضخم الحميد فقط.

متى يُستخدم

- لعلاج البروستاتا الكبيرة جداً غير المناسبة لإجراء المنظار الاعتيادي (TURP)
- خاصةً عند وجود حصوات المثانة أو جيوب المثانة الكبيرة
- البدائل المنظارية للغدد الكبيرة (HoLEP, Aquablation) متاحة — يُرشدك جراحك إلى الخيار الأنسب

تعلم المصطلحات

الاستئصال البسيط للبروستاتا

إزالة الجزء الداخلي المتضخم من البروستاتا لعلاج BPH (وليس السرطان).

الأدينوما

الأنسجة الداخلية الحميدة التي تُستأصل.

الاستئصال الجذري للبروستاتا

عملية مختلفة تُزيل البروستاتا كاملةً لعلاج السرطان.

مفتوح أو روبوتي

عبر شق واحد، أو عبر شقوق صغيرة بالمنظار.

القذف الرجعي

نشوة جافة — من التأثيرات الشائعة بعد العملية.

القسطرة

أنبوب لتصريف المثانة لعدة أيام بعد الجراحة.

هل سيؤلم؟ تُجرى العملية تحت التخدير العام فلا تشعر بشيء أثناءها. ولأنها عملية بطنية، يكون التعافي أطول من إجراءات المنظار — توقع بضعة أيام في المستشفى (أقل مع الجراحة الروبوتية)، وقسرة لعدة أيام، ونشاطاً محدوداً لأسابيع قليلة.

كيف تستعدّ

ما الذي تتوقعه بعد

- تُجرى تحت التخدير العام — اتّبع تعليمات الصيام والأدوية (أوقف ممّيعات الدم كما يُوصى).
- فحص بول مسبق للتأكد من خلوه من العدوى.
- لا تدخّن؛ رتّب وسيلة توصيل ومساعدة في المنزل.
- تحسّن قوي ودائم في تدفق البول.
- القذف الرجعي (النشوة الجافة) شائع؛ التأثيرات الجسيمة على الانتصاب أو التحكم في البول نادرة.

ما الذي يحدث & بعد

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- عدم القدرة على التبول بعد إزالة القسرة
- نزيف غزير أو جلطات أو حمّى أو قشعريرة
- ألم متزايد في البطن، أو احمرار/إفراز من الجرح
- ألم في الصدر، صعوبة في التنفس، أو ألم وتورّم في الساق (طارئ)

ثلاثة أمور تذكّرها

1. الاستئصال البسيط يُزيل الجزء الداخلي المتضخم من البروستاتا لعلاج BPH الشديد — وليس عملية السرطان (التي تُزيل البروستاتا كاملةً).
2. فعّالة جداً للغدد الكبيرة؛ التعافي أطول من إجراءات المنظار (HoLEP/Aquablation بدائل منظارية).
3. توقع القذف الجاف وقسرة لعدة أيام. اتصل إذا عجزت عن التبول، أو حدث نزيف غزير، أو ارتفعت الحرارة.

1 أنت نائم؛ تُعطى المضادات الحيوية.

2 عبر نهج بطني مفتوح أو روبوتي، يُستأصل الجزء الداخلي المتضخم من البروستاتا مع الإبقاء على الغلاف الخارجي.

3 توضع قسرة (وأحياناً مصرف)؛ الإقامة في المستشفى بضعة أيام (أقل مع الروبوتية).

4 تبقى القسرة عادةً عدة أيام حتى نحو أسبوع.

توقع بولاً ملوّناً بالدم في البداية؛ تجنّب الرفع الثقيل والإجهاد لعدة أسابيع.