

سلس البول الإجهادي (SUI) هو تسرّب البول عند تعرّض المثانة لضغط مفاجئ، كالسعال أو العطس أو الضحك أو الرفع أو ممارسة الرياضة. يحدث لدى المرأة حين يضعف الدعم تحت الإحليل (مجرى البول)، وكثيرًا ما يكون ذلك بعد الولادة أو انقطاع الطمث. الحالة شائعة جدًا وقابلة للعلاج بخيارات متعددة، من التمارين البسيطة حتى الجراحة الفعالة.

عن هذه الحالة

يبقى الإحليل (مجرى البول) مغلقًا عادةً عند السعال أو الإجهاد، بفضل دعم قاع الحوض والأنسجة المحيطة. حين يضعف هذا الدعم، تدفع الزيادة المفاجئة في ضغط البطن البول للخروج. العلامة المميّزة هي التسرّب عند النشاط — لا عند شعور مفاجئ بالإلحاح (ذاك هو فرط نشاط المثانة؛ وجود الحالتين معًا يُسمّى سلسًا مختلطًا).

الأسباب

- الحمل والولادة (من أبرز الأسباب)
- انقطاع الطمث والشيخوخة
- السعال المزمن، الإمساك، أو الرفع المتكرر للأثقال
- زيادة الوزن والجراحة الحوضية السابقة

تعلم المصطلحات

سلس البول الإجهادي

تسرّب البول مع الضغط — السعال، الرفع، الرياضة.

الإحليل

الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم.

قاع الحوض

العضلات التي تدعم المثانة والإحليل.

تمارين كيجل

تمارين شدّ قاع الحوض لتقوية الدعم.

السلس المختلط

وجود تسرّب إجهادي وتسرّب إلحاحي معًا.

الفرزجة (pessary) / حشوة

دعامة صغيرة تُوضع في المهبل للحدّ من التسرّب.

حقن الإحليل

حقنة سريعة في العيادة تساعد على إغلاق الإحليل.

حبال الإحليل المتوسط

شريط دعم صغير يُوضع تحت الإحليل في العملية الجراحية.

هل أحتاج إلى جراحة؟ ليس بالضرورة. كثير من النساء يتحسنن بتمارين قاع الحوض وتغييرات بسيطة، وبعضهن يستخدمن جهاز دعم. الجراحة (كالحيال) فعالة جدًا إن أردت حلًا أطول أمداً — لكنّه خيارك، ويمكنك البدء بالخطوات الأبسط.

كيف تُشخّص

التعايش مع SUI

- تعلّمي شدّ عضلات قاع الحوض قبل السعال أو العطس أو الرفع («تقنية الشدّ»).
- مارسي تمارين قاع الحوض يوميًا — قد يستغرق تحسّن الأعراض 6-12 أسبوعًا.
- عالجي الإمساك والسعال المزمن اللذين يزيدان الضغط.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حرقّة، إلحاح، أو دم في البول (قد يكون عدوى)
- تسرّب مصحوب بالبحاح شديد أيضًا — العلاج قد يختلف
- شعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل

ثلاثة أمور تذكّرها

1. سلس البول الإجهادي لدى المرأة تسرّب ناجم عن ضعف الدعم تحت الإحليل — شائع وقابل للعلاج.
2. الخيارات تتدرّج من تمارين قاع الحوض وجهاز دعم، إلى حقن الإحليل، إلى الحبال للإصلاح الدائم.
3. التمارين تحتاج أسابيع لتؤتي نتيجة؛ شدّي قبل السعال أو الرفع. الجراحة خيار لا إلزام.

كيف تُعالج (خطوة بخطوة)

1. تمارين قاع الحوض (كيجل) والعلاج الطبيعي، وخفض الوزن، وعلاج السعال أو الإمساك.
2. أجهزة الدعم — فرزجة مهبلية (pessary) أو حشوة متاحة دون وصفة.
3. حقن الإحليل — حقنة سريعة في العيادة تساعد على إغلاق الإحليل.
4. الجراحة — حبال الإحليل المتوسط (أو حبال لفافة ذاتية) للإصلاح الدائم. لكل خيار نشرة خاصة.