

तनाव मूत्र असंयम (SUI) — महिला

WARWIKI

रोगी जानकारी · खाँसने, हँसने, उठाने या व्यायाम से पेशाब का रिसाव

तनाव मूत्र असंयम (SUI) में खाँसने, छींकने, हँसने, वज़न उठाने या व्यायाम के दौरान अचानक मूत्राशय पर दबाव पड़ने से पेशाब रिसता है। महिलाओं में यह तब होता है जब मूत्रमार्ग के नीचे का सहारा कमज़ोर हो जाता है — अक्सर प्रसव या रजोनिवृत्ति के बाद। यह बहुत सामान्य है और पूरी तरह ठीक हो सकता है — साधारण व्यायाम से लेकर एक छोटी, बहुत प्रभावी सर्जरी तक।

इस स्थिति के बारे में

मूत्रमार्ग (वह नली जिससे पेशाब निकलता है) सामान्यतः खाँसने या ज़ोर लगाने पर बंद रहता है — पेल्विक फ़्लोर और आसपास के ऊतकों के सहारे से। जब यह सहारा कमज़ोर हो जाता है, तो पेट में अचानक दबाव बढ़ने पर पेशाब बाहर आ जाता है। इसकी पहचान है **गतिविधि के साथ रिसाव** — अचानक तीव्र इच्छा के साथ नहीं (वह अति सक्रिय मूत्राशय है; दोनों का होना **मिश्रित** असंयम कहलाता है)।

कारण

- **गर्भावस्था और प्रसव** (मुख्य कारण)
- **रजोनिवृत्ति** और उम्र बढ़ना
- लंबे समय तक खाँसी, कब्ज़ या भारी सामान उठाना
- अधिक वज़न और पहले की पेल्विक सर्जरी

शब्दों को समझें

तनाव असंयम

खाँसने, उठाने, व्यायाम से दबाव पड़ने पर पेशाब का रिसाव।

मूत्रमार्ग

वह नली जो पेशाब को शरीर से बाहर ले जाती है।

पेल्विक फ़्लोर

मांसपेशियाँ जो मूत्राशय और मूत्रमार्ग को सहारा देती हैं।

केगेल (Kegels)

पेल्विक फ़्लोर को कसने के व्यायाम।

मिश्रित असंयम

तनाव और तीव्र इच्छा दोनों से रिसाव।

पेसरी (Pessary)

योनि में रखा छोटा सहारा उपकरण जो रिसाव कम करता है।

यूरेथ्रल बल्किंग

कार्यालय में दिया इंजेक्शन जो मूत्रमार्ग को बंद रखने में मदद करता है।

मिड-यूरेथ्रल स्लिंग (sling)

सर्जरी में मूत्रमार्ग के नीचे लगाया छोटा mesh सहारा।

क्या मुझे सर्जरी चाहिए? ज़रूरी नहीं। कई महिलाओं में केगेल और सरल बदलावों से सुधार होता है; कुछ support device का उपयोग करती हैं। सर्जरी (जैसे sling) बहुत प्रभावी है अगर आप दीर्घकालिक समाधान चाहती हैं — लेकिन यह आपका निर्णय है।

जाँच कैसे होती है

- रिसाव कब होता है इस पर बातचीत और जाँच (कभी-कभी खाँसी test)
- संक्रमण दूर करने के लिए **पेशाब की जाँच** और मूत्राशय खाली होने की जाँच
- सर्जरी से पहले कभी-कभी यूरोडायनेमिक्स test

इलाज कैसे होता है (चरण दर चरण)

- 1 **पेल्विक फ्लोर व्यायाम (केगेल)** और फिज़िकल थेरेपी, वज़न घटाना, खाँसी या कब्ज़ का उपचार।
- 2 **Support device** — योनि में पेसरी (pessary) या ओवर-द-काउंटर insert।
- 3 **यूरेथ्रल बल्किंग** — कार्यालय में दिया त्वरित इंजेक्शन।
- 4 **सर्जरी** — **मिड-यूरेथ्रल sling** (या ऑटोलोगस फेशियल sling) से स्थायी समाधान। हर विकल्प की अलग जानकारी शीट है।

SUI के साथ जीना

- खाँसने, छींकने या उठाने से पहले **पेल्विक फ्लोर कर्से** ("the knack")।
- केगेल प्रतिदिन करें — 6–12 हफ्तों में फर्क दिखता है।
- कब्ज़ और पुरानी खाँसी का इलाज करें जो दबाव बढ़ाते हैं।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- जलन, तीव्र इच्छा या **पेशाब में खून** (संभावित संक्रमण)
- **तीव्र इच्छा** के साथ भी रिसाव — उपचार अलग हो सकता है
- मूत्राशय पूरी तरह खाली न होने का एहसास

याद रखने योग्य तीन बातें

1. SUI में दबाव से पेशाब रिसता है क्योंकि मूत्रमार्ग का सहारा कमज़ोर हो जाता है — यह सामान्य और पूरी तरह ठीक हो सकने वाली स्थिति है।
2. विकल्प हैं: केगेल और support device, ऑफिस बल्किंग इंजेक्शन, या sling सर्जरी।
3. व्यायाम में हफ्ते लगते हैं; खाँसने से पहले पेल्विक फ्लोर कर्से। सर्जरी विकल्प है, अनिवार्यता नहीं।