

टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (पुरुष)

रोगी जानकारी · पुष्टि किए गए कम टेस्टोस्टेरोन और लक्षणों का उपचार

WARWIKI

टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (TRT) उन पुरुषों के लिए है जिनका टेस्टोस्टेरोन स्तर पुष्टि से कम हो और साथ ही लक्षण भी हों — जैसे कामेच्छा में कमी, थकान, उदास मन, या मांसपेशियों और स्तंभन में कमी। यह gel, injection, patch, या प्रत्यारोपित pellets द्वारा टेस्टोस्टेरोन को सामान्य स्तर पर लाती है। यह "एंटी-एजिंग" उपचार नहीं है और सामान्य स्तर वाले पुरुषों के लिए नहीं है।

यह कैसे काम करती है & किसके लिए है

कम टेस्टोस्टेरोन (hypogonadism) की पहचान **दो सुबह के blood tests** और लक्षणों दोनों से होती है — केवल एक कम संख्या पर्याप्त नहीं है। जब दोनों हों, तो TRT से ऊर्जा, कामेच्छा, मनोदशा और मांसपेशियों में हफ्तों से महीनों में सुधार हो सकता है।

उपलब्ध रूप

- **Gel या solution** — रोज़ लगाएं (महिलाओं और बच्चों को skin-to-skin संपर्क से बचाएं)।
- **Injections** — हर 1–2 हफ्ते, या लंबे समय वाला रूप हर ~10 हफ्ते।
- **Patches, प्रत्यारोपित pellets** (हर 3–6 महीने), या nasal gel।

शब्दों को समझें

Testosterone

मुख्य पुरुष हार्मोन; कामेच्छा, ऊर्जा, मनोदशा और मांसपेशियों को प्रभावित करता है।

Hypogonadism

पुष्टि किया गया कम टेस्टोस्टेरोन।

Hematocrit

एक blood count जो TRT से बढ़ सकती है — इसकी निगरानी की जाती है।

PSA

प्रोस्टेट blood test जो उपचार से पहले और दौरान जाँचा जाता है।

Fertility

TRT शुक्राणु उत्पादन कम करती है — यदि बच्चे चाहते हैं तो ज़रूरी बात है।

Gel transfer

Gel का दूसरों की skin पर लगना — क्षेत्र ढके और हाथ धोएं।

क्या आप बच्चे चाहते हैं? पहले अपनी टीम को बताएं। TRT शुक्राणु उत्पादन कम करती है और बांझपन का कारण बन सकती है — कभी-कभी स्थायी रूप से। यदि fertility आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसे अन्य उपचार हैं जो शुक्राणु की रक्षा करते हुए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं। इस पर चर्चा किए बिना TRT शुरू न करें।

निगरानी (ज़रूरी)

TRT के लिए नियमित जाँच और blood tests ज़रूरी हैं:

- **Testosterone level** — यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सामान्य सीमा में हैं।
- **Hematocrit** — TRT से खून गाढ़ा हो सकता है; यदि बहुत अधिक हो, तो खुराक घटाई या रोकी जाती है।
- **PSA / प्रोस्टेट** — पहले और दौरान जाँचा जाता है; अनुपचारित प्रोस्टेट cancer में TRT शुरू नहीं की जाती।

सुरक्षित उपयोग

- **Gel:** निर्देशानुसार लगाएं, सूखने दें, क्षेत्र ढकें, हाथ धोएं — महिलाओं/बच्चों को transfer से बचाएं।
- खुद खुराक न बदलें; सभी lab appointments पर जाएं।
- हृदय रोग या **sleep apnea** के बारे में टीम को बताएं (TRT इसे बिगाड़ सकती है)।

सामान्य दुष्प्रभाव

- मुंहासे, तैलीय skin, तरल प्रतिधारण
- स्तनों में संवेदनशीलता; छोटे अंडकोष; कम fertility
- लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ सकती हैं (निगरानी या blood draw की ज़रूरत हो सकती है)

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- सीने में दर्द, पैर में सूजन/दर्द, या सांस लेने में तकलीफ
- तेज़ सिरदर्द, नज़र में बदलाव, या खून गाढ़े होने के लक्षण
- नई पेशाब की परेशानी या प्रोस्टेट संबंधी चिंता

याद रखने योग्य तीन बातें

1. TRT उन पुरुषों के लिए है जिनका टेस्टोस्टेरोन **पुष्टि से कम हो और लक्षण भी हों** — सामान्य स्तर या एंटी-एजिंग के लिए नहीं।
2. यह **fertility कम करती है** — यदि बच्चे चाहते हों तो शुरू करने से पहले टीम को बताएं।
3. नियमित निगरानी ज़रूरी है (testosterone, blood count, प्रोस्टेट)। Gel से दूसरों को transfer से बचाएं।