

TURP — प्रोस्टेट का ट्रांसयूरैथ्रल रिसेक्शन

रोगी जानकारी · बड़े हुए प्रोस्टेट के लिए मानक सर्जरी

WARWIKI

TURP बड़े हुए प्रोस्टेट (BPH) के कारण पेशाब में रुकावट के लिए की जाने वाली एक सामान्य और प्रभावी सर्जरी है। इसमें कोई बाहरी चीरा नहीं लगता — सर्जन मूत्रमार्ग (urethra) से एक scope डालकर प्रोस्टेट के भीतरी हिस्से को हटाता है जो पेशाब के रास्ते को दबा रहा था। इससे पेशाब का बहाव मज़बूत और दीर्घकालिक रूप से बेहतर होता है।

इस प्रक्रिया के बारे में

एक पतला उपकरण (**resectoscope**) मूत्रमार्ग से डाला जाता है। एक छोटे विद्युत loop से सर्जन रुकावट पैदा करने वाले प्रोस्टेट के भीतरी हिस्से को टुकड़ों में निकालता है और पेशाब का रास्ता चौड़ा करता है। प्रोस्टेट का बाहरी हिस्सा वहीं रहता है। उपचार के दौरान कैथेटर लगाया जाता है।

क्या यह सुरक्षित है?

TURP सबसे अधिक अध्ययन की गई यूरोलॉजिक सर्जरी में से एक है। किसी भी सर्जरी की तरह इसमें भी कुछ जोखिम हैं — रक्तस्राव, संक्रमण, अस्थायी जलन — और कुछ दीर्घकालिक बदलाव (नीचे देखें)। यह **मध्यम आकार** के प्रोस्टेट के लिए सबसे उपयुक्त है; बहुत बड़े प्रोस्टेट के लिए HoLEP, Aquablation, या simple prostatectomy बेहतर हो सकती है।

शब्दों को समझें

TURP

प्रोस्टेट का ट्रांसयूरैथ्रल रिसेक्शन — BPH के लिए scope सर्जरी।

BPH

बड़ा हुआ प्रोस्टेट (कैंसर नहीं)।

Resectoscope

प्रोस्टेट काटने के लिए उपयोग किया जाने वाला scope-loop उपकरण।

प्रतिगामी वीर्यपात

वीर्य मूत्राशय में पीछे जाना — यह सामान्य और हानिरहित दुष्प्रभाव है।

Catheter

मूत्राशय को निकासी देने वाली नली, 1–3 दिन तक।

Bladder irrigation

शुरुआती दिनों में catheter से खून साफ करने के लिए हल्की सफाई।

बाद में क्या बदलता है? अधिकांश पुरुषों में पेशाब का बहाव काफी मज़बूत हो जाता है। सबसे सामान्य दीर्घकालिक बदलाव है **प्रतिगामी वीर्यपात** — वीर्य मूत्राशय में पीछे चला जाता है, इसलिए orgasm सामान्य लगता है लेकिन तरल बहुत कम या नहीं होता। यह हानिरहित है (हालाँकि प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है)। स्तंभन दोष (ED) या मूत्र असंयम जैसे गंभीर दुष्प्रभाव असामान्य हैं।

तैयारी कैसे करें

- **Spinal या general anesthesia** के तहत की जाती है — उपवास और दवाओं के निर्देश मारने (blood thinners बंद करें जैसा बताया जाए)।
- पहले **urine test** से संक्रमण जाँचा जाता है।
- घर जाने के लिए किसी को साथ लाएँ; कुछ दिनों के लिए catheter की योजना रखें।

क्या होता है & बाद में

- 1 आप सोए रहते हैं या सुन्न रहते हैं; antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 Scope से रुकावट डालने वाले प्रोस्टेट ऊतक को हटाया जाता है।
- 3 Catheter लगाया जाता है, पहले दिन हल्की bladder irrigation भी हो सकती है।
- 4 आमतौर पर एक रात अस्पताल में; catheter **1–3 दिन** में निकाला जाता है।

कुछ हफ्तों तक **खून मिला पेशाब** और जलन/urgency हो सकती है; खूब पानी पिएँ और भारी काम से बचें।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- Catheter निकलने के बाद **पेशाब न हो**
- **भारी रक्तसाव या clots** जो बहाव बंद करें
- बुखार या ठंड लगना
- बढ़ता हुआ रक्तसाव (1–2 हफ्तों में थोड़ा खून आना सामान्य है — आराम करें और पानी पिएँ)

याद रखने योग्य तीन बातें

1. TURP scope से प्रोस्टेट के भीतरी हिस्से को हटाती है (कोई चीरा नहीं) — मध्यम BPH के लिए दीर्घकालिक और बहुत प्रभावी मानक सर्जरी।
2. पेशाब का बहाव मज़बूत होगा; सामान्य दीर्घकालिक बदलाव प्रतिगामी वीर्यपात है (हानिरहित)।
3. खून मिला पेशाब और जलन कुछ हफ्तों में ठीक होती है। पेशाब न होने, भारी रक्तसाव या बुखार पर तुरंत बुलाएँ।