

मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI)

रोगी जानकारी · UTI क्या है, इसका इलाज और बचाव कैसे करें

WARWIKI

मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI) तब होता है जब बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में पनपने लगते हैं। अधिकतर मामलों में यह मूत्राशय का संक्रमण होता है, जिससे जलन, तीव्र इच्छा और बार-बार पेशाब आता है। कभी-कभी संक्रमण गुर्दे तक पहुँच जाता है, जो अधिक गंभीर है। सही antibiotic से अधिकतर UTI जल्दी ठीक हो जाते हैं, और दोबारा होने से बचाव के उपाय भी मौजूद हैं।

इस स्थिति के बारे में

मूत्राशय का संक्रमण (cystitis) आमतौर पर इन लक्षणों से पहचाना जाता है:

- पेशाब करते समय **जलन या चुभन**
- **तीव्र इच्छा और बार-बार पेशाब** — थोड़ी-थोड़ी मात्रा में
- बादलदार, गहरे रंग का या तेज़ गंध वाला पेशाब; पेट के निचले हिस्से में बेचैनी

गुर्दे का संक्रमण (pyelonephritis) अधिक गंभीर है और इसमें **बुखार, ठंड लगना, पीठ या बाजू में दर्द, और मतली** भी होती है — इस पर तुरंत ध्यान देना ज़रूरी है।

कारण

बैक्टीरिया (आमतौर पर आँत से) मूत्रमार्ग के रास्ते मूत्राशय में पहुँचते हैं। खतरा बढ़ाने वाले कारकों में शामिल हैं: **यौन संबंध, मेनोपॉज़** (एस्ट्रोजन कम होना), मूत्राशय पूरी तरह न खाली होना, कैथेटर, पथरी, और मधुमेह।

शब्दों को समझें

UTI

मूत्र मार्ग में कहीं भी संक्रमण।

Cystitis

मूत्राशय का संक्रमण — सबसे सामान्य UTI।

Pyelonephritis

गुर्दे का संक्रमण — अधिक गंभीर, अक्सर बुखार के साथ।

Urine culture

एक test जिसमें बैक्टीरिया उगाकर सही antibiotic चुनी जाती है।

Recurrent UTI

बार-बार होने वाला संक्रमण (साल में 2–3 या अधिक बार)।

Vaginal estrogen

कम खुराक की cream/tablet जो मेनोपॉज़ के बाद UTI का खतरा कम करती है।

Asymptomatic bacteriuria

पेशाब में बैक्टीरिया, पर कोई लक्षण नहीं — आमतौर पर इलाज नहीं होता।

क्या मुझे हमेशा antibiotic लेनी होगी? यदि लक्षण हैं, तो UTI का इलाज antibiotic से होता है। लेकिन यदि urine test में बैक्टीरिया मिले और आप **ठीक** महसूस कर रहे हैं, तो आमतौर पर इलाज **नहीं** होता — ऐसे में antibiotic नुकसानदेह हो सकती है। गर्भावस्था और कुछ मूत्र प्रक्रियाओं से पहले अपवाद हैं।

जाँच और इलाज कैसे होता है

- आपकी चिकित्सा टीम **लक्षणों** और **urine test/culture** से UTI की पुष्टि करती है।
- मूत्राशय का संक्रमण **छोटे antibiotic course** से ठीक होता है।
- **गुर्दे के संक्रमण** में कभी-कभी अधिक मज़बूत या लंबा antibiotic course और अस्पताल की ज़रूरत पड़ सकती है।
- बेहतर महसूस होने पर भी पूरा course पूरा करें।

दोबारा UTI से बचाव

- **खूब पानी पिएँ** और लंबे समय तक पेशाब न रोकें।
- यौन संबंध के बाद पेशाब करें; आगे से पीछे की ओर पोंछें।
- मेनोपॉज़ के बाद **vaginal estrogen** खतरा कम कर सकती है।
- non-antibiotic विकल्पों के बारे में पूछें; बार-बार UTI होने पर preventive antibiotic के बारे में भी।

जानने योग्य बातें

- Cranberry products और D-mannose कुछ लोगों की मदद करते हैं; प्रमाण मिश्रित हैं — आजमाना उचित है।
- बार-बार UTI होने पर कारण जानने की जाँच (मूत्राशय न खाली होना, पथरी) हो सकती है।
- यदि आपका कैथेटर है, तो कुछ बैक्टीरिया सामान्य हैं — इलाज केवल लक्षणों के आधार पर होता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- **बुखार, ठंड लगना, या पीठ/बाजू में दर्द** (गुर्दे का संक्रमण हो सकता है)
- मतली या उल्टी, या बहुत अधिक अस्वस्थ महसूस होना
- पेशाब में **खून** दिखना, या antibiotic से लक्षण ठीक न होना
- आप गर्भवती हैं और UTI के कोई भी लक्षण हैं

याद रखने योग्य तीन बातें

1. अधिकतर UTI मूत्राशय के संक्रमण होते हैं (जलन, तीव्र इच्छा) जो छोटे antibiotic course से ठीक होते हैं; गुर्दे का संक्रमण (बुखार, बाजू में दर्द) अधिक गंभीर है।
2. पेशाब में बैक्टीरिया हों पर **लक्षण न हों** तो आमतौर पर इलाज नहीं होता — सिवाय गर्भावस्था या कुछ प्रक्रियाओं से पहले।
3. खूब पानी पिएँ, यौन संबंध के बाद पेशाब करें, और मेनोपॉज़ के बाद vaginal estrogen लें। बुखार, बाजू में दर्द, या उल्टी होने पर तुरंत देखभाल लें।