

Intracavernosal Injections (Penile Injections para sa ED)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Sariling iniksyon para sa erectile dysfunction

Ang intracavernosal injection (ICI) ay paggamot para sa erectile dysfunction (ED) na ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng maliit na halaga ng gamot sa gilid ng ari (penis) gamit ang napakaliit na karayom upang makagawa ng erection. Ginagamit ito kapag hindi epektibo o hindi angkop ang mga tableta para sa erection. Maaaring nakakatakot ito sa simula, ngunit ang karayom ay napakaliit, at kaunting sakit lang ang nararamdaman ng karamihan ng mga lalaki — isa ito sa pinaka-maaasahang paggamot na hindi nangangailangan ng operasyon.

Tungkol sa Paggamot na Ito

Ang gamot (kadalasang **alprostadil**, o isang halo na tinatawag na **bimix** o **trimix**) ay nagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo sa loob ng ari upang pumasok ang dugo. Gumagana ito **kahit hindi ka pa nararamdamang naaakit**, at karaniwang nagbubunga ng erection sa loob ng **5–15 minuto** na tumatagal nang humigit-kumulang 30–60 minuto.

- Ang **unang dosis ay ibinibigay sa klinika** upang mahanap ang tamang dami at masiguro na ligtas para sa inyo.
- Pagtapos nito, matuturo sa inyo kung paano **mag-inject sa bahay**.
- Madalas na epektibo kahit nabigo na ang mga tableta, kasama na pagkatapos ng operasyon sa prostate.

Ligtas Ba Ito?

Para sa karamihan ng mga lalaki, oo — kapag maingat na natukoy ang dosis. Ang pinakamahalagang panganib ay ang **matagal na erection (priapism)** nang higit sa 4 na oras, na isang emerhensya. Kabilang din sa ibang epekto ang banayad na kirot, paminsan-minsang pasa, at sa paglipas ng panahon, mga matitigas na tama (peklat) sa lugar ng iniksyon — makatutulong ang pagpapalit ng lugar ng iniksyon sa bawat pagkakataon.

MGA TERMINO

Erectile dysfunction (ED)

Kahirapan sa pagkuha o pagpapanatili ng erection para sa pakikipagtalik.

Intracavernosal

Sa loob ng mga silid ng erection (corpora cavernosa) ng ari.

Alprostadil

Karaniwang isang-gamot na iniksyon para sa ED.

Trimix / bimix

Halo ng dalawa o tatlong gamot na ginagamit para sa iniksyon.

Titration

Paghahanap ng tamang dosis, kadalasang nagsisimula sa klinika.

Priapism

Erection na tumatagal nang higit sa 4 na oras — isang medikal na emerhensya.

PDE5 inhibitors

Mga tableta para sa erection (tulad ng sildenafil); ang ICI ay opsyon kapag hindi ito gumana.

MASAKIT BA? Ang karayom ay napakanipisip at inilalagay sa gilid ng ari, kung saan karamihan ng mga lalaki ay nararamdaman lamang ng maliit na kurot — hindi sa sensitibong tuktok o ilalim. Ang banayad na kirot pagkatapos ay karaniwan, lalo na sa alprostadil. Bantayan ng inyong care team ang inyong unang dosis upang masiguro na komportable at ligtas ito.

Paano Gamitin nang Ligtas

- 1 **Unang dosis sa klinika** upang matukoy ang tamang dami — huwag kailanman dagdagan ang dosis nang walang pahintulot ng doktor.
- 2 Mag-inject sa **gilid ng ari** (bandang posisyon ng ika-3 o ika-9 ng orasan); **iwasan ang tuktok at ilalim**, at **palit-palitin ang gilid** sa bawat pagkakataon.
- 3 Pindutin nang maigi ang lugar sa loob ng ilang minuto pagkatapos upang mabawasan ang pasa.
- 4 Gamitin ito **ayon lamang sa ipinayo ng inyong care team** — sa pangkalahatan, hindi hihigit sa isang beses sa loob ng 24 na oras o mga 3 beses sa isang linggo.

Paano Maghanda

- Itago ang gamot ayon sa tagubilin (ang ilang halo ay kailangang ilagay sa ref).
- Sabihin sa inyong care team ang tungkol sa **mga pampalabnaw ng dugo** at anumang kondisyon sa puso.
- Maaaring magdala ng kasama sa pagtuturo kung nakakatulong ito sa inyong kaginhawaan.

Humingi ng agarang tulong kung:

- Ang erection ay tumatagal nang **higit sa 4 na oras** (priapism — matagal na erection nang higit sa 4 na oras) — pumunta agad sa ER; ang pagdadamot ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala
- Naramdaman ang matinding sakit, matinding pagdurugo, o palatandaan ng impeksiyon sa lugar ng iniksyon
- Naramdaman ang hilo o sakit sa dibdib pagkatapos ng dosis

Mahalagang Malaman

- Dalhin ang impormasyon ng dosis at oras na ibinigay ng inyong care team.
- Iulat ang anumang bagong matitigas na bukol o pagkurba ng ari.

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Gumagamit ang ICI ng napakaliit na karayom upang mailagay ang gamot sa gilid ng ari, na nagbubunga ng maaasahang erection sa loob ng 5–15 minuto — kapaki-pakinabang kapag hindi gumana ang mga tableta.
2. Ang inyong unang dosis ay tinutukoy sa klinika; huwag kailanman taasan ang dosis nang mag-isa, palit-palitin ang mga gilid ng iniksyon, at huwag lagpasan ang limitasyong ibinigay sa inyo.
3. Ang erection na tumatagal nang **higit sa 4 na oras ay emerhensya** — pumunta agad sa ER.