

Male Urethral Sling

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Sling para sa pagtagas ng ihi pagkatapos ng prostatectomy

Ang male urethral sling ay isang malambot na strip ng mesh na inilalagay sa ilalim ng urethra (ang tubo na dinadaan ng ihi) para gamutin ang hindi makontrol na pag-ihing — lalo na ang pagtagas kapag umubo, nagbubuhat, o gumagalaw pagkatapos ng operasyon sa prostate. Itinaas nito ang urethra para mas mahawakan ang ihi. Hindi katulad ng artificial sphincter, walang pump o button na kailangang gamitin. Ipinaliwanag ng handout na ito kung paano ito gumagana, paano maghanda, at ano ang inaasahan.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Ang pagtagas ng ihi kapag gumagalaw, umubo, o nagbubuhat ay tinatawag na **stress incontinence**, at madalas itong mangyari pagkatapos ng operasyon sa prostate. Ginagamot ito ng sling sa pamamagitan ng paglalagay ng malambot na mesh strip sa ilalim ng urethra at pag-angat nito pabalik sa tamang posisyon.

Ang sling ay **sumusuporta** sa urethra at hindi ito sinasamantala, kaya kapag gumaling na kayo **normal na umihi** — walang pump, button, o device na gagamitin.

Mga Dapat Malaman

Pinaka-epektibo ang sling para sa **banayad hanggang katamtamang** pagtagas ng ihi sa mga lalaki na may natitirang function ng sphincter, na sinusuri ng siruhano bago ang operasyon. Para sa mas mabigat na pagtagas, o kung nakatanggap kayo ng **radiation sa pelvis**, ang **artificial urinary sphincter (AUS)** ay kadalasang mas angkop — tatalakayin ng inyong siruhano kung alin ang para sa inyo. Maaaring **mabawasan** lang (hindi tuluyang mawala) ang pagtagas, at kung hindi sapat, maaari pang ilagay ang sphincter sa ibang pagkakataon.

MGA TERMINO

Stress incontinence

Pagtagas ng ihi kapag gumagalaw, umubo, o nagbubuhat.

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan.

Sling

Malambot na strip ng mesh sa ilalim ng urethra para itaas at suportahan ito.

Repositioning check

Pagtingin sa loob gamit ang maliit na camera para kumpirmahin na makakatulong ang pag-angat ng urethra.

Urinary retention

Pansamantalang hrap sa pag-ihing pagkatapos ng operasyon; maaaring kailanganin ang catheter nang ilang araw.

Artificial sphincter (AUS)

Alternatibong device na may pump, para sa mas mabigat na pagtagas ng ihi.

General anesthesia

Gamot na nagpapatulog at pumipigil ng sakit habang nasa operasyon.

MASAKIT BA? Isinasagawa ang operasyon sa ilalim ng general o spinal anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, masakit, namamaga, at may pasa ang singit at perineum sa loob ng ilang linggo — makakatulong ang yelo, scrotal support, at pain medicine. Tumatagal ito ng mga isang oras; marami ang nakakauwi sa araw din.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Isinasagawa sa **general o spinal anesthesia** — sundin ang tagubilin (pag-aayuno, gamot na ihihint, kasama ang blood thinners).
- Ang **urine test** ay naghahanap ng impeksiyon (gagamutin muna), at kinukumpirma ng **cystoscopy** na makakatulong ang sling.
- Huwag manigarilyo**, pamahalaan ang timbang at diabetes, at uminom ng antibiotics ayon sa tagubilin.

Sabihin sa inyong care team bago pa kung kayo ay:

- Nakatanggap ng **radiation sa pelvis** — madalas na hindi gaanong epektibo ang sling, at maaaring mas angkop ang sphincter
- Nagpaaoperasyon na noon para sa pagtagas ng ihi, o may pagsikip ng urethra (stricture)
- May impeksiyon kahit saan sa katawan

Ano ang Nangyayari Habang Naka-Operasyon

- 1 Natutulog o namamanhid kayo mula sa baywang pababa sa ilalim ng anesthesia, at binibigyan ng antibiotics.
- 2 Sa pamamagitan ng maliliit na hiwa sa singit at sa pagitan ng scrotum at puwit, inilalagay ng siruhano ang mesh sling sa ilalim ng urethra at itinaas ito sa tamang posisyon.
- 3 Isinasangga ang sling, tinahi ang mga hiwa, at kadalasang naglalagay ng catheter nang ilang sandali.

Pagkatapos ng Operasyon

- Gumamit ng yelo, scrotal support, at pain medicine para sa sakit at pamamaga.
- Iwasan ang mabigat na pagbubuhat, pag-unat, pagbibisikleta, at pakikipagtalik** sa loob ng ilang linggo (~6) — maaaring gumalaw ang sling bago gumaling.
- Maaaring may **pansamantalang hirap sa pag-ihi** at kailanganin ng catheter nang ilang araw.
- Patuloy na gumamit ng pads sa simula — maaaring unti-unting bumuti sa mga susunod na linggo. **Walang gagalaw**; kapag gumaling na, normal na umihi.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Hindi kayo makapag-ihi** sa lahat
- Lagnat o panginginig, o lumalaking pamumula, sakit, o tagas sa hiwa
- Lumalalang sakit sa singit o perineum

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang male urethral sling ay isang mesh strip sa ilalim ng urethra para itaas at suportahan ito, nagpapabuti ng kontrol sa ihi pagkatapos ng prostatectomy — walang gagalaw.
2. Pinaka-epektibo ito para sa **banayad hanggang katamtamang** pagtagas; para sa mas mabigat o pagkatapos ng radiation, mas angkop ang artificial sphincter (maaaring ilagay mamaya).
3. Pagkatapos, **iwasan ang mabigat na pagbubuhat, pag-unat, pagbibisikleta, at pakikipagtalik** sa ilang linggo para gumaling ang sling. Maaaring may pansamantalang hirap sa pag-ihi.