

Malleable Penile Implant

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Semi-rigid na implant para sa erectile dysfunction

Ang malleable penile implant — tinatawag ding semi-rigid implant — ay dalawang malambot na bendable rods na inilalagay sa loob ng ari (penis), para sa mga lalaking hindi gumaling ang erectile dysfunction (ED) sa gamot, injections, o ibang lunas. Walang pump: i-baluktutin lang pataas para sa sex, at pababa para itago. Ipinaliliwanag ng handout na ito kung paano ito gumagana, kung paano maghanda, at ano ang aasahan.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Kapag hindi gumaling ang **erectile dysfunction (ED)** sa gamot, vacuum device, o injections, ang implant ang pinaka-maaasahang susunod na hakbang. Ang malleable implant ang pinaka-simpleng uri — dalawang malambot na bendable rods ang inilalagay sa loob ng penis. Lagi itong sapat ang tigas para sa sex, at ikaw mismo ang magpoposisyon:

- I-baluktutin **pataas** para sa sex
- I-baluktutin **pababa** para itago sa ilalim ng damit

Dahil walang pump, reservoir, o likido, ito ang **pinaka-simple at pinaka-matibay** na uri ng implant — magandang pagpipilian kung mahirap gamitin ang pump (hal., mahina ang kamay).

Mga Dapat Malaman

Tulad ng lahat ng penile implant, ito ay **permanenteng pagpipilian**: binabago ng implant ang erectile tissue, kaya hindi na gagana ang natural na erection at ibang ED treatments (gamot, injections) pagkatapos. **Hindi nito binabago ang pag-ihi, pakiramdam, orgasm, o ejaculation.** Kumpara sa inflatable type: lagi itong matigas, kaya medyo mas mahirap itago at hindi gaya ng natural na erection — ngunit mas simple at mas matagal.

MGA TERMINO

Erectile dysfunction (ED)

Hirap makakuha o mapanatili ng tigas ng ari (erection) para sa sex.

Penile implant

Device na inilalagay sa penis para makagawa ng erection kapag hindi na gumana ang ibang lunas.

Malleable / semi-rigid

Bendable na implant na lagi itong matigas; ikaw ang magpoposisyon, walang pump.

Inflatable implant

Ang isa pang uri — may pump na nagpapalaki at nagpapaliit; mas natural, pero mas maraming parte.

Concealment

Pag-baluktutin ang penis pababa para hindi mapansin ang implant sa ilalim ng damit.

General anesthesia

Gamot na nagpapatulog at nagpapawalang-sakit habang operasyon.

Matibay (durable)

Matagal ang buhay — walang mga parte na may likido, kaya kaunti ang masisira.

MASAKIT BA? Ang operasyon ay sa ilalim ng general o spinal anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, masakit, namamaga, at may pasa ang ari at scrotum sa loob ng ilang linggo — makakatulong ang scrotal support, yelo, at pain medicine. Maikli ito (kadalasan wala pang isang oras), madalas same-day.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Ginagawa sa **general o spinal anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin (pag-aayuno, at kung aling gamot ang ihihint, kasama ang blood thinners).
- **Kritikal ang pag-iwas sa impeksiyon para sa implant:** kailangang gamunalin muna ang anumang impeksiyon (kasama ang UTI); maliligo ka gamit ang antiseptic soap at matatanggap ng antibiotics.
- **Huwag manigarilyo o mag-vape**, at kung mayroon kang **diabetes**, gusto ng inyong team na kontrolado ang blood sugar — parehong nagpapababa ng panganib ng impeksiyon.

Sabihin sa inyong team **nang maaga** kung kayo ay may:

- **Diabetes**, o anumang kondisyon na nakakaapekto sa paggaling ng sugat
- Nakaraan na operasyon sa pelvic o penis, radiation, o naunang implant

Ano ang Nangyayari Habang Operasyon

- 1 Ikaw ay natutulog o manhid mula sa baywang pababa sa ilalim ng anesthesia, at ibinibigay ang antibiotics.
- 2 Sa pamamagitan ng isang maliit na hiwa, inilalagay ng siruhano ang **isang bendable rod sa bawat isa sa dalawang chamber** ng penis. Walang pump o reservoir.
- 3 Isinasara ang hiwa at inilalagay ang penis na nakaturo pababa. Maaaring may catheter na ilalagay nang ilang sandali.

Pagkatapos ng Operasyon

- Magsuot ng scrotal support, gumamit ng yelo, uminom ng pain medicine, at panatilihin malinis at tuyo ang hiwa.
- **Huwag gamitin ang implant para sa sex hanggang hindi ka pinayagan ng siruhano** — kadalasan mga **4–6 na linggo**, kapag kumpleto na ang paggaling.
- Kapag gumaling na, **walang pump na kailangang matutunan** — i-baluktutin lang pataas para gamitin at pababa para itago. Ipapakita ng inyong team kung paano.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginig, o lumalaking pamumula, sakit, pamamaga, o pagtatago ng likido sa hiwa
- Hindi makapagih
- Matinding sakit o lumalala, o mukhang madilim o maitim ang penis

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang malleable implant ay dalawang bendable rods sa penis — i-baluktutin pataas para sa sex, pababa para itago. Walang pump; pinaka-simple at pinaka-matibay na uri.
2. Ito ay **permanenteng pagpipilian** (hindi na gagana ang natural na erection at gamot/injections pagkatapos), ngunit **hindi nito binabago ang pag-ih, pakiramdam, orgasm, o ejaculation**.
3. Pinakamahalagang iwasan ang impeksiyon: gamutin muna ang impeksiyon, huwag manigarilyo, kontrolin ang diabetes, at gamitin ang antiseptic wash at antibiotics. Huwag gamitin para sa sex hangga't hindi pinapayagan (~4–6 linggo).