

Nocturia

Impormasyon para sa Pasyente · Paggising sa gabi para umihi — kung bakit nangyayari at paano mapabuti

WARWIKI

Ang nocturia ay ang paggising mula sa tulog nang isa o higit pang beses para umihi. Ito ay karaniwan, lalo na sa pagtanda, ngunit hindi kailangang tanggapin lamang — nakakaabala ito sa tulog, nagdudulot ng antok sa araw, at nagpapataas ng panganib ng pagbagsak sa gabi. Karamihan sa mga sanhi ay maaaring gamutin kapag nalaman ang dahilan.

Tungkol sa Kondisyong Ito

May tatlong pangunahing dahilan kung bakit gumigising ang mga tao para umihi, at marami ang may **kombinasyon** ng mga ito:

- **Paggawa ng sobrang daming ihi sa gabi** (nocturnal polyuria) — mula sa pag-inom ng maraming likido sa gabi, caffeine o alkohol, pamamaga ng binti, problema sa puso o bato, sleep apnea, o gamot na diuretic.
- **Pantog na may maliit na kapasidad** — mula sa overactive bladder o paglaki ng prostate.
- **Naputol na tulog** — gumigising kayo nang may ibang dahilan at pagkatapos ay nag-ihi na rin.

Bakit Ito Mahalaga

Bukod sa masamang tulog, ang paggising sa gabi ay isa sa mga pangunahing sanhi ng **pagbagsak at bali ng buto** sa matatanda. Dahil ang nocturia ay madalas na nagpapahiwatig ng isang nararapat gamutin na problema (at minsan sa sleep apnea o problema sa puso), sulit itong suriin kaysa balewalain.

MGA TERMINO

Nocturia

Paggising mula sa tulog para umihi.

Nocturnal polyuria

Paggawa ng malaking bahagi ng inyong pang-araw-araw na ihi sa gabi.

Frequency-volume chart

Talaan ng oras at dami ng pag-ihi, araw at gabi.

Overactive bladder

Pantog na nagbibigay ng agarang senyales at may maliit na kapasidad.

Sleep apnea

Karamdaman sa paghinga habang natutulog na maaaring magpataas ng pag-ihi sa gabi.

Desmopressin

Gamot na nagbabawas ng pag-ihi sa gabi para sa ilang pasyente.

ANG UNANG HAKBANG: BLADDER DIARY Ang pagpapanatili ng isang **frequency-volume chart** (talaan ng pag-ihi) sa loob ng ilang araw — isulat kung kailan at magkano ang inyong iniinom at ihi, araw at gabi — ang pinaka-kapaki-pakinabang na magagawa ninyo. Sinasabi nito sa inyong care team kung **alin** sa mga sanhi ang nagdudulot ng inyong nocturia, na siyang magtutukoy ng tamang lunas.

Paano Ito Nasusuri

- Isang **bladder diary** at pagsusuri ng inyong mga likido, gamot, at tulog
- Isang **urine test**, at pagsusuri para sa paglaki ng prostate o overactive bladder
- Pag-screen para sa **pamamaga ng binti, sleep apnea**, o mga sanhing may kaugnayan sa puso/bato kung kinakailangan

Paano Ito Ginagamot

- 1 **Mga gawi sa gabi** — limitahan ang mga likido, caffeine, at alkohol sa loob ng 3–4 na oras bago matulog.
- 2 **Para sa pamamaga ng binti** — itaas ang inyong mga binti sa hapon, gumamit ng compression stockings, at uminom ng diuretic nang mas maaga sa araw (ayon sa tagubilin).
- 3 **Gamutin ang sanhi sa pantog** — overactive bladder o paglaki ng prostate.
- 4 **Gamot o paggamot sa tulog** — hal., desmopressin para sa tunay na sobrang produksyon ng ihi sa gabi, o paggamot ng sleep apnea.

Pananatiling Ligtas sa Gabi

- Gumamit ng **night light** at panatiliing malinis ang daanan patungo sa banyo para maiwasan ang pagbagsak.
- Tumayo nang dahan-dahan, lalo na kung umiinom kayo ng gamot para sa blood pressure.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Dugo sa ihi**, pangangati, o lagnat (posibleng impeksiyon)
- Sa desmopressin: **pagduwal, sakit ng ulo, o kalituhan** (posibleng mababang sodium)
- Pamamaga, hirap sa paghinga, o malaking pagbabago sa dami ng inyong ihi

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang nocturia — paggising para umihi — ay karaniwan, nakakaabala sa tulog, at nagpapataas ng panganib ng pagbagsak; karaniwang may nararapat gamutin na sanhi ito.
2. Ang ilang araw ng bladder diary ang pangunahing unang hakbang para mahanap ang sanhi at tamang solusyon.
3. Bawasan ang likido sa gabi, pamahalaan ang pamamaga ng binti, at gamutin ang sanhi sa pantog o tulog. Iwasan ang pagbagsak sa gabi gamit ang ilaw at malinis na daanan.