

Optilume Drug-Coated Balloon

Impormasyon para sa Pasyente · Paggamot ng pagsikip ng urethra gamit ang balloon at gamot

WARWIKI

Ang Optilume ay isang minimally invasive na paggamot para sa pagsikip (stricture) ng urethra — ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan. Ang espesyal na balloon ay nagpapalawak ng makipot na bahagi at sabay na nagpapalabas ng gamot sa dingding upang maiwasan ang muling pagbuo ng peklat. Walang paggupit at walang hiwa sa labas.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Ang **stricture** ng urethra ay isang makipot na bahagi na puno ng peklat na nagpapabagal ng daloy ng ihi. Ang simpleng pagpapalawak o paggupit ay madalas na nagpapahintulot itong makipot muli. Ginagawa ng Optilume ang dalawang bagay nang sabay:

- Ang **balloon ay nagpapalawak** ng makipot na bahagi.
- Ang **drug coating (paclitaxel)** sa balloon ay naihatid sa tisyu upang mapabagal ang muling pagbuo ng peklat.

Ito ay angkop para sa mga piling **paulit-ulit na stricture** sa bulbar urethra (sa ilalim ng scrotum) na **mas maikli sa humigit-kumulang 3 cm** at bumalik pagkatapos ng nakaraang pagpapalawak o pagputol. Ito ay mas matibay kaysa sa simpleng dilation, ngunit **hindi katulad ng urethroplasty** (bukas na pag-aayos), na siyang pinaka-matibay na opsyon. Ipapaliwanag ng inyong siruhano kung paano ito angkop para sa inyo.

Ligtas Ba Ito?

Ang Optilume ay minimally invasive at isinasagawa sa pamamagitan ng urethra, kadalasan bilang outpatient. Karaniwang mahusay itong tinatanggap. Ang dosis ng gamot ay maliit at nananatili sa lokal na lugar. Kasama sa mga panganib ang dugo sa ihi o tamod, maikling pagsusunog, impeksiyon sa ihi, at ang posibleng pagbabalik pa rin ng pagsikip sa paglipas ng panahon.

MGA TERMINO

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan.

Stricture

Isang makipot na bahagi ng urethra na puno ng peklat na nagpapabagal ng daloy ng ihi.

Bulbar urethra

Ang bahagi ng urethra sa ilalim ng scrotum, kung saan pinaka-epektibo ang paggamot na ito.

Drug-coated balloon

Isang balloon na nagpapalawak ng pagsikip at naghahatid ng gamot sa dingding.

Paclitaxel

Ang gamot sa balloon na tumutulong na maiwasan ang muling pagbabalik ng peklat.

Dilation

Pagpapalawak ng pagsikip — dito, ginagawa gamit ang balloon.

Cystoscope

Isang manipis na camera na ginagamit para hanapin at suriin ang pagsikip.

Catheter

Isang malambot na tubo na inilalagay sa urethra nang ilang sandali pagkatapos ng prosedura.

MASAKIT BA? Ang prosedura ay sa ilalim ng anesthesia o sedation, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, asahan ang banayad na pagsusunog, bahagyang sakit sa pelvis o ari, at kaunting dugo sa ihi o tamod nang ilang araw. May catheter nang ilang oras. Maikli ito, kadalasang same-day.

Paano Maghanda (Bago ang Prosedura)

- Sundin ang inyong **mga tagubilin para sa anesthesia o sedation** (pag-aayuno, at kung aling mga gamot ang ihihinto, kasama ang blood thinners).
- Ang **pagsusuri ng ihi** ay nagtsetsek para sa impeksiyon — ang anumang impeksiyon ay dapat muna gamutin.
- **Mag-ayos ng sasakyan pauwi**, at maghanda para sa catheter nang ilang sandali.

Sabihin sa inyong care team **nang maaga** kung kayo ay:

- Umiinom ng **blood thinner**, o may kasalukuyang impeksiyon sa ihi
- **Nagpaplanong magkaroon ng anak** — dahil sa gamot, hihilingin sa inyong gumamit ng condom at iwasang subukang magconceive sa panahong itutukoy ng inyong care team

Ano ang Nangyayari Habang ang Prosedura

- 1 Kayo ay natutulog o nasa sedation, at ang cystoscope ay nagkukumpirma ng haba at lokasyon ng pagsikip.
- 2 Isang manipis na wire ang dinadaan sa pagsikip, at ang lugar ay pinalawak nang bahagya upang mapasok ang balloon.
- 3 Ang drug-coated balloon ay inilalagay sa gitna ng peklar at pinalakas nang takdang panahon, na naghahatid ng gamot.
- 4 Ang balloon at scope ay tinatanggal, at isang catheter ang inilalagay nang ilang sandali.

Pagkatapos ng Prosedura

- Ang catheter ay tinatanggal pagkatapos ng **ilang sandali**; sasabihin ng inyong care team kung kailan.
- Asahan ang **banayad na pagsusunog at maputlang pula na ihi o tamod** nang ilang araw. Nakakatulong ang pag-inom ng dagdag na tubig.
- **Iwasan ang mabigat na aktibidad** nang ilang sandali, at mag-follow up para sa pagsusuri ng daloy o sintomas.
- **Gumamit ng condom** sa panahong inirerekomenda ng inyong care team, dahil sa gamot.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- **Hindi kayo makaihi**, lalo na pagkatapos matanggal ang catheter
- Matinding pagdurugo, o mga namuong dugo sa ihi
- Sakit na lumalala sa halip na gumagaling

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang Optilume ay nagpapalawak ng makitid na urethra gamit ang balloon at naghahatid ng gamot laban sa muling pagsara — endoscopic na opsyon, hindi kapalit ng bukas na urethroplasty.
2. Para maghanda: sundin ang mga tagubilin sa pag-aayuno at gamot, gamutin muna ang anumang impeksiyon, mag-ayos ng sasakyan, at sabihin sa inyong care team kung nagpaplanong magkaroon ng anak.
3. Normal ang banayad na pagsusunog at kaunting dugo sa ihi o tamod nang ilang araw. Gumamit ng condom sa inirerekomendang panahon.