

Orthotopic Neobladder

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Bagong pantog mula sa bituka, inihi sa natural na paraan

Ang orthotopic neobladder ay isang bagong pantog na ginawa mula sa sarili ninyong bituka at ikinabit sa urethra, para makapagihi kayo nang natural — walang bag — pagkatapos alisin o hindi na gumana ang pantog. Nangangailangan ito ng pagsasanay para matutunan ang tamang pag-aalis ng ihi at kontrolin ito.

Tungkol sa Operasyong Ito

Mga **16–24 pulgada ng maliliit na bituka** ang bubukas at titipikin upang maging mababang-presyon na reservoir (lalagyan), pagkatapos ay ikakabit sa inyong **urethra**; ang mga ureter (mga tubo mula sa bato) ay dadaan dito. **Walang stoma at walang bag**.

Dahil gawa sa bituka ang bagong pantog, **hindi** ito nagbibigay ng parehong senyales ng "gusto nang umihi," kaya matututo kayo na:

- Umihi ayon sa **iskedyul** — sa pamamagitan ng pagrelax ng pelvic floor at banayad na pagtulak — kasama ang **paggising sa gabi**.
- Gumamit ng catheter upang alisan ng natitirang ihi kung hindi ito lubos na naubos (mas karaniwan sa mga babae).
- Mag-ehersisyo ng **pelvic floor** para mapalakas ang kontrol.

Ang kontrol ay bumubuti sa loob ng **ilang buwan**; ang pagtagas ng ihi, lalo na sa gabi, ay karaniwan sa simula. Hindi lahat ay angkop — depende ito sa urethra, function ng bato, at kakayahang sundin ang rutina.

Ligtas Ba Ito?

Ito ay isang kilalang opsyon na nagbibigay ng pinaka-"natural" na resulta. Mas malaki at mas matagal na operasyon kaysa sa conduit at nangangailangan ng mas maraming pag-aaral at pag-aalaga. Kasama sa mga panganib: pagdurugo, impeksiyon, pagtagas mula sa tahi, pagtagas ng ihi araw o gabi, hindi kumpletong pag-aalis ng ihi na nangangailangan ng catheter, uhog (mucus), impeksiyon sa ihi, at pangmatagalang pagbabago sa asin/bitamina/bato na sinusundan sa follow-up.

MGA TERMINO

Neobladder

Bagong pantog na ginawa mula sa piraso ng bituka.

Orthotopic

Inilagay sa normal na lugar at ikinabit sa urethra, para makapagihi sa karaniwang paraan.

Urethra

Ang tubo na dinadaan ng ihi palabas ng katawan.

Mga Ureter

Mga tubo na nagdadala ng ihi mula sa mga bato patungo sa neobladder.

Timed voiding

Pag-ihing ayon sa itinakdang iskedyul (araw at gabi) sa halip na hintayin ang pagnanais.

Sariling pag-catheter

Ang sariling pagpasok ng manipis na tubo upang lubos na maalisan ang ihi sa neobladder kung kinakailangan.

Pelvic floor

Mga kalamnan na sinasakay para tulungan ang paghawak at paglabas ng ihi.

Mucus

Malapot na likido na ginagawa ng bituka; normal ang makita ito sa ihi.

MASAKIT BA? Ang operasyon ay sa ilalim ng general anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, namamaga ang tiyan at ilang araw bago "gumising" ang bituka. Magigising kayo na may catheter sa bagong pantog (mga 2–3 linggo) at malambot na mga stent. Nananatili sa ospital mga 5–8 araw.

Paano Maghanda (Bago sa Operasyon)

- Isinasagawa sa ilalim ng **general anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin (pag-aayuno, ihinto ang blood thinner ayon sa utos). Maaaring may **bowel prep**.
- Unawain ang commitment: **timed voiding araw at gabi**, posibleng **sariling pag-catheter**, at pelvic floor exercises.
- Huwag manigarilyo**, at mag-ayos ng tulong sa bahay pagkatapos.

Sabihin sa inyong team nang maaga kung kayo ay:

- Umiinom ng **blood thinner**, o may kasalukuyang impeksiyon
- May **sakit sa bituka** o problema sa bato, o naoperahan o na-radyasyon dati sa tiyan

Ano ang Nangyayari sa Panahon ng Operasyon

- Natutulog kayo sa ilalim ng anesthesia at ibinibigay ang antibiotics.
- Kinukuha ang isang piraso ng bituka at muling ikinakabit ang natitira.
- Binubuksan at titipikin ang bituka upang maging reservoir (lalagyan), pagkatapos ay tinatahi sa urethra.
- Ikinakabit ang mga ureter sa reservoir; inilalagay ang catheter at malambot na mga stent habang gumagaling ito.

Pagkatapos ng Operasyon

- Uuwi kayo sa loob ng mga **5–8 araw** na may **catheter (~2–3 linggo)**; babanlawan ito para alisin ang mucus. Bago alisin ang catheter, may **X-ray ng paggaling**.
- Pagkatapos ay matututunan ang **timed voiding** (mag-alarm sa gabi), pelvic floor exercises, at **sariling pag-catheter** kung hindi ito lubos na naubos.
- Asahan ang **pagtagas ng ihi sa simula** (lalo sa gabi) na bumubuti sa loob ng ilang buwan. Normal ang mucus; uminom ng maraming tubig; panghabambuhay na follow-up (kasama ang bitamina B12).

Tawagan ang inyong care team o humingi ng tulong kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Hindi makapagihi** o ang catheter ay **huminto sa pag-agas**
- Matinding sakit sa tiyan, pagsusuka, o **walang hangin o dumi**
- Matinding pagdurugo, pamumula o pagtagas sa sugat, o sakit sa tagiliran

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

- Ang neobladder ay bagong pantog na gawa sa bituka at ikinabit sa urethra, para makapagihi nang natural nang walang bag.
- Kailangan ng pagsasanay: timed voiding araw at gabi, pelvic floor exercises, at kung minsan ay sariling pag-catheter. Bumubuti ang kontrol sa loob ng ilang buwan at normal ang pagtagas sa simula.
- Maghanda: sundin ang pag-aayuno at bowel prep, at huwag manigarilyo. Huwag alisin ang catheter hangga't hindi ito tinatanggal ng team pagkatapos ng healing X-ray.