

Overactive Bladder (OAB)

Impormasyon para sa Pasyente · Pag-unawa sa biglaang pagnanais umihi, madalas na pag-ihi, at pagtagas **WARWIKI**

Ang overactive bladder, o OAB, ay isang karaniwang kondisyon na maaaring gamutin kung saan ang kalamnan ng pantog ay kumikilos nang hindi dapat. Nagdudulot ito ng **biglaang matinding pagnanais umihi**, madalas na pag-ihi, paggising sa gabi para umihi, at minsan ay pagtagas bago makarating sa banyo. Ito ay **hindi** normal na bahagi ng pagtanda, at maraming paraan para pagbutihin ito.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Karaniwan, ang pantog ay dahan-dahang napupuno at nagbibigay ng senyas kapag halos puno na ito. Sa OAB, nagpapadala ang pantog ng "agarang" senyas nang masyadong maaga o masyadong malakas. Ang mga pangunahing sintomas ay:

- **Urgency** (biglaang pangangailangang umihi) — biglaang mahirap-pigilin na pagnanais umihi
- **Frequency** (madalas na pag-ihi) — umihi nang higit sa walong beses sa isang araw
- **Nocturia** (paggising sa gabi para umihi) — nagigising sa gabi para umihi
- **Urge leakage** — minsan nagtatago ng ihi habang naglalakad papunta sa banyo

Mga Sanhi

Kadalasan ay walang iisang sanhi — ito ay problema sa mga senyas sa pagitan ng pantog at utak. Ang mga bagay na maaaring mag-trigger o magpalala nito ay kabilang ang **caffeine at alkohol**, konstipasyon (paninigas ng dumi), sobrang timbang, ilang gamot, at (sa mga babae) menopause. Ang impeksiyon sa ihi (UTI) ay maaaring magdulot ng parehong sintomas, kaya ito ay sinusuri muna. Minsan, may kaugnayan din sa kondisyon ng nerbyos.

MGA TERMINO

Overactive bladder (OAB)

Urgency at madalas na pag-ihi dahil sa pagkibot ng pantog nang masyadong maaga.

Urgency

Biglaang matinding pagnanais umihi na mahirap pigilan.

Frequency

Pangangailangan umihi nang maraming beses sa maghapon.

Nocturia

Paggising mula sa tulog para umihi.

Urge incontinence

Pagtagas ng ihi kasabay ng matinding pagnanais umihi.

Bladder diary

Simpleng talaan ng mga ininom, beses ng pag-ihi, at pagtagas.

Pelvic floor

Mga kalamnan na maaaring palakasin para kontrolin ang pantog.

Bladder training

Unti-unting pagpapalawak ng agwat sa pagitan ng pag-ihi para mabawasan ang urgency.

GUMAGALING BA ITO? Oo — karamihan sa mga tao ay gumagaling. Ang paggamot ay kadalasang nagsisimula sa simpleng pagbabago at bladder training, at unti-unting inaakyat kung kinakailangan. Maaaring tumagal ng ilang linggo bago mapansin ang pagbabago, kaya bigyan ng oras ang bawat hakbang at patuloy na makipagtulungan sa inyong care team.

Paano Ito Nasusuri

- Pag-uusap tungkol sa inyong mga sintomas at isang **bladder diary**
- Isang **pagsusuri ng ihi** para ibukod ang impeksiyon o dugo sa ihi
- Pagsuri kung gaano kahusay ang pagbubuga (mabilis na bladder scan)
- Minsan ay may karagdagang pagsusuri (urodynamics o cystoscopy) kung hindi malinaw ang larawan o hindi gumana ang ibang paggamot

Paano Ito Ginagamot (Hakbang-hakbang)

- 1 Pagbabago ng pamumuhay at training** — bawasan ang caffeine at alkohol, kontrolin ang inuming likido, gamutin ang konstipasyon, mabawasan ang timbang, at gawin ang **bladder training at pelvic floor exercises (Kegel)**.
- 2 Mga gamot** — mga tableta na nagpapakalma ng kalamnan ng pantog.
- 3 Mga advanced na opsyon** — **Botox** sa pantog, o **nerve stimulation** (PTNS o sacral neuromodulation). Bawat isa ay may sariling handout.

Pamumuhay Dito

- Gumawa ng **bladder diary** sa loob ng ilang araw para makilala ang mga trigger.
- Uminom ng likido nang dahan-dahan at tuluy-tuloy; huwag labis na bawasan para hindi masyadong maasim ang ihi.
- Gumamit ng **timed trips** at mga pamamaraan ng "urge-control" (huminto, pigilan ang pelvic floor, huminga, tapos pumunta) na ituturo ng inyong care team.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Dugo sa ihi**, o sakit o pangangati kapag umiihi
- Lagnat, o sakit sa likod o tagiliran (posibleng impeksiyon)
- Biglaang **hindi makaihi**

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang OAB — urgency, madalas na pag-ihing paggising sa gabi, at minsan ay pagtagas — ay karaniwan at nagagamot; hindi ito normal na bahagi ng pagtanda.
2. Ang paggamot ay unti-unting inaakyat: pamumuhay at bladder training muna, pagkatapos ay mga gamot, saka Botox o nerve stimulation.
3. Ang bladder diary ay tumutulong na mahanap ang mga trigger; bigyan ng ilang linggo ang bawat hakbang. Tumawag para sa dugo sa ihi, sakit, lagnat, o kawalan ng kakayahang umihi.