

# Nội soi bàng quang

Thông tin cho bệnh nhân · Quan sát bên trong bàng quang và niệu đạo

WARWIKI

Nội soi bàng quang (cystoscopy) cho phép bác sĩ nhìn vào bên trong niệu đạo và bàng quang bằng một ống soi mỏng có gắn camera nhỏ và đèn, đưa nhẹ nhàng qua lỗ tiểu tự nhiên. Thủ thuật này giúp tìm nguyên nhân gây tiểu ra máu, nhiễm trùng, hẹp niệu đạo hoặc các vấn đề bàng quang khác — và để kiểm tra kết quả sau điều trị.

## Về xét nghiệm này

Ống soi bàng quang là một ống mỏng có camera ở đầu. Có hai loại:

- Ống soi bàng quang **mềm (linh hoạt)** thường dùng tại phòng khám khi bạn còn tỉnh, có bôi gel gây tê.
- Ống soi bàng quang **cứng** được dùng trong phòng mổ khi bạn đã được gây mê, cho phép bác sĩ vừa chẩn đoán vừa điều trị trong cùng một lần.

Dung dịch vô khuẩn được bơm vào để mở rộng bàng quang giúp nhìn rõ thành bàng quang. Bác sĩ có thể chỉ định nội soi bàng quang để:

- Tìm nguyên nhân gây **tiểu ra máu** hoặc nhiễm trùng tái phát
- Phát hiện **hẹp niệu đạo**, sỏi hoặc khối u
- Kiểm tra quá trình lành sau điều trị, hoặc lấy mẫu mô nhỏ (sinh thiết)
- Đặt, kiểm tra hoặc tháo **ống đỡ (stent)** hay chỉ khâu

## Có an toàn không?

Có. Nội soi bàng quang là một trong những thủ thuật tiết niệu phổ biến nhất và ít rủi ro. Hầu hết bệnh nhân chỉ cảm thấy khó chịu thoáng qua. Tác dụng phụ không thường gặp — nhiễm trùng nước tiểu, chảy máu nhẹ, hoặc rát và khó tiểu ngắn hạn — thường nhẹ và nhanh hết.

## GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

### Ống soi bàng quang

Ống mỏng có camera và đèn dùng để quan sát bên trong bàng quang.

### Bàng quang

Túi cơ chứa nước tiểu cho đến khi bạn đi tiểu.

### Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể.

### Ống soi mềm và cứng

Ống soi linh hoạt (dùng khi tỉnh, tại phòng khám) hoặc ống soi cứng (dùng khi gây mê, trong phòng mổ).

### Gel gây tê

Thuốc tê tại chỗ bôi vào niệu đạo để ống soi đi qua thoải mái hơn.

### Sinh thiết

Lấy một mảnh mô nhỏ để xem dưới kính hiển vi.

### Ống đỡ (stent)

Ống mềm giữ cho đường dẫn không bị hẹp; có thể được đặt vào hoặc tháo ra trong quá trình nội soi.

### Lượng nước tiểu tồn dư

Lượng nước tiểu còn lại trong bàng quang sau khi bạn đã đi tiểu.

**CÓ ĐAU KHÔNG?** Với ống soi mềm, bạn có thể cảm thấy áp lực hoặc châm chích nhẹ khi ống đi qua — gel gây tê sẽ giúp giảm bớt, và thủ thuật tại phòng khám thường kết thúc trong vài phút. Với ống soi cứng, bạn được gây mê và không cảm thấy gì trong suốt quá trình. Hãy thông báo ngay cho nhóm chăm sóc nếu bạn cảm thấy khó chịu.

## Cách chuẩn bị (Trước khi làm xét nghiệm)

- Với nội soi bàng quang **tại phòng khám (ống soi mềm)**, bạn thường có thể **ăn uống và uống thuốc thường ngày như bình thường**, và tự lái xe về nhà.
- Với nội soi bàng quang **dưới gây mê**, hãy tuân theo hướng dẫn phẫu thuật — nhịn ăn, tạm ngưng các thuốc được chỉ định, và nhờ người đưa về.
- Bạn có thể được yêu cầu cung cấp **mẫu nước tiểu** để kiểm tra nhiễm trùng, và có thể được cho dùng **kháng sinh**.

Hãy báo cho nhóm chăm sóc **trước** nếu bạn:

- Đang dùng **thuốc làm loãng máu**
- Có dấu hiệu **nhiễm trùng đường tiết niệu** (rất buốt, sốt, hoặc nước tiểu đục, mùi hôi) — nếu đang nhiễm trùng, thủ thuật có thể phải hoãn lại
- Có dị ứng, hoặc có hẹp niệu đạo làm ống soi khó đặt trong lần trước

## Quá trình thực hiện

- Bạn nằm ngửa thoải mái, nhóm chăm sóc giúp bạn vào tư thế đúng. Vùng lỗ tiểu được làm sạch và bôi gel gây tê.
- Ống soi bàng quang được đưa nhẹ nhàng qua niệu đạo vào bàng quang.
- Dung dịch vô khuẩn được bơm vào để mở rộng bàng quang, bác sĩ quan sát toàn bộ niêm mạc bên trong.
- Rút ống soi ra. Nếu có kế hoạch điều trị, sinh thiết hoặc thay stent, các thao tác này được thực hiện trước khi rút ống.

## Sau khi làm xét nghiệm

- Sau nội soi tại phòng khám, bạn thường có thể **trở lại hoạt động bình thường ngay**; sau gây mê, bạn cần nghỉ ngơi và nhờ người đưa về.
- Bạn có thể cảm thấy **rất nhẹ khi đi tiểu** trong khoảng một ngày. Uống nhiều nước giúp làm dịu và đào thải nhanh hơn.
- Nước tiểu có thể có **màu hồng nhạt** trong thời gian ngắn. Điều này thường gặp và thường hết trong vòng một ngày.

### Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Khó tiểu hoặc hoàn toàn không tiểu được
- Chảy máu nhiều hoặc cục máu đông trong nước tiểu
- Đau ngày càng nặng hơn thay vì giảm dần

## BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Nội soi bàng quang là thủ thuật nhanh, an toàn để quan sát bên trong bàng quang và niệu đạo bằng camera nhỏ — giúp bác sĩ tìm vấn đề hoặc kiểm tra sau điều trị.
- Nội soi tại phòng khám hầu như không cần chuẩn bị đặc biệt. Nếu gây mê, hãy nhịn ăn theo hướng dẫn và nhờ người đưa về. Báo cho nhóm chăm sóc về thuốc làm loãng máu hoặc dấu hiệu nhiễm trùng.
- Rất nhẹ hoặc nước tiểu hơi hồng trong một ngày là bình thường — uống nhiều nước, và gọi ngay nếu bạn sốt, chảy máu nhiều hoặc không tiểu được.