

Kích thích thần kinh chày qua cấy ghép (ITNS)

Thông tin cho bệnh nhân · Thiết bị cấy ghép nhỏ gần mắt cá chân để điều trị bàng quang tăng hoạt **WARWIKI**

ITNS là thiết bị nhỏ được đặt gần mắt cá chân, kích thích nhẹ nhàng **thần kinh chày** để làm dịu **bàng quang tăng hoạt** — tiểu gấp, tiểu nhiều lần và tiểu không kiểm soát do tiểu gấp. Thiết bị hoạt động tương tự PTNS (điều trị mắt cá chân tại phòng khám), nhưng vì được **cấy ghép**, bạn có thể điều trị **tại nhà** thay vì đến phòng khám mỗi tuần.

Cơ chế hoạt động

Thần kinh chày, gần mắt trong mắt cá chân, kết nối đến các dây thần kinh cột sống điều khiển bàng quang. Kích thích nhẹ dây thần kinh này sẽ gửi tín hiệu **tái lập trình và làm dịu** sự tăng hoạt của bàng quang — giảm tiểu gấp và tiểu rì. Thiết bị cấy ghép cung cấp các xung điện đó cho bạn, nên bạn không cần quay lại phòng khám nhiều lần. Không dùng thuốc và không có tác dụng phụ toàn thân.

Liệu pháp này có phù hợp với tôi không?

- Lựa chọn tốt cho **bàng quang tăng hoạt** (tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu rì do tiểu gấp), đặc biệt khi thuốc không hiệu quả hoặc gây tác dụng phụ
- Không dùng thuốc — hữu ích nếu bạn không thể dùng thuốc bàng quang
- Thường được chọn bởi những người thấy **PTNS tại phòng khám có hiệu quả** nhưng khó duy trì lịch hàng tuần
- Khác với “máy tạo nhịp bàng quang” (điều hòa thần kinh cùng), hầu hết thiết bị ITNS **không cần giai đoạn thử nghiệm** trước

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Bàng quang tăng hoạt

Tiểu gấp và tiểu nhiều lần do bàng quang co thắt quá sớm.

Thần kinh chày

Dây thần kinh gần mắt cá chân, kết nối với nguồn cung cấp thần kinh của bàng quang.

Điều hòa thần kinh

Dùng xung điện nhẹ để làm dịu các dây thần kinh tăng hoạt.

Thiết bị cấy ghép

Thiết bị nhỏ được đặt dưới da qua một thủ thuật ngắn.

Băng đeo cổ chân

Băng đeo tháo lắp được dùng để cấp nguồn và điều khiển một số thiết bị.

Gây tê tại chỗ

Thuốc gây tê để vùng đó không đau trong khi bạn vẫn tỉnh táo.

CÓ ĐAU KHÔNG? Thiết bị được đặt trong một **thủ thuật ngoại trú ngắn** sử dụng thuốc gây tê (gây tê tại chỗ) — bạn tỉnh táo nhưng không đau, chỉ cảm thấy một chút áp lực. Bản thân liệu pháp chỉ như cảm giác **ngứa ran** nhẹ hoặc co ngón chân nhẹ, không phải đau. Hầu hết bệnh nhân về nhà trong ngày.

Cách thực hiện

- 1 Qua một **vết rạch nhỏ gần mắt cá chân**, thiết bị được đặt gần thần kinh chày — thường dưới gây tê tại chỗ, trong khoảng **20–35 phút**.
- 2 Vết thương được khâu lại và để lành; liệu pháp thường bắt đầu **vài tuần sau**.
- 3 Nhóm chăm sóc sẽ cài đặt thông số và hướng dẫn bạn cách sử dụng thiết bị.

Hai loại thiết bị

- Một loại được **cấy ghép hoàn toàn và chạy bằng pin bên trong** — không cần đeo gì hoặc sạc pin; thiết bị tự kích thích theo lịch đặt sẵn.
- Loại kia **không có pin bên trong**; bạn đeo một **băng cổ chân nhỏ** để cấp nguồn và tự chạy các buổi điều trị tại nhà.
- Bác sĩ phẫu thuật sẽ cho bạn biết bạn được dùng loại nào và cách sử dụng.

Sau khi

- Đau nhẹ hoặc sưng tại mắt cá chân trong vài ngày; giữ sạch và khô, tránh vận động nặng trong thời gian lành thương.
- Hiệu quả **tăng dần theo từng tuần** — nhiều người cải thiện ít nhất một nửa triệu chứng, và hiệu quả kéo dài nhiều năm.
- Có thể **tắt hoặc tháo ra** nếu cần. Quy định về MRI khác nhau tùy thiết bị — luôn thông báo cho nhóm chụp hình rằng bạn có thiết bị cấy ghép.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Đỏ, sưng, chảy dịch hoặc sốt (có thể bị nhiễm trùng)
- Đau mới hoặc tăng nặng tại vị trí mắt cá chân
- **Mất hiệu quả đột ngột** hoặc cảm giác kích thích khó chịu

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. ITNS là thiết bị cấy ghép nhỏ gần mắt cá chân giúp làm dịu bằng quang tăng hoạt — phiên bản điều trị tại nhà của PTNS, không dùng thuốc và không có tác dụng phụ toàn thân.
2. Thiết bị được đặt qua thủ thuật ngoại trú ngắn, thường dưới gây tê tại chỗ, và hầu hết thiết bị **không cần giai đoạn thử nghiệm** trước.
3. Hiệu quả tăng dần theo tuần và kéo dài nhiều năm; hãy gọi nếu bị nhiễm trùng tại vết thương, đau mới, hoặc mất hiệu quả đột ngột.