

कृत्रिम मूत्र नियंत्रण उपकरण (AUS)

रोगी जानकारी · AUS सर्जरी से पहले क्या उम्मीद करें

WARWIKI

कृत्रिम मूत्र नियंत्रण उपकरण (AUS) एक छोटा उपकरण है जो पूरी तरह आपकी त्वचा के नीचे लगाया जाता है और मूत्र असंयम (पेशाब का रिसाव) को नियंत्रित करता है — अक्सर प्रोस्टेट सर्जरी के बाद। आप इसे अंडकोष में छिपे pump से खुद चलाते हैं। यह handout बताता है कि यह कैसे काम करता है, तैयारी कैसे करें, और क्या उम्मीद करें।

इस प्रक्रिया के बारे में

गतिविधि, खाँसी, या भारी चीज़ उठाने समय पेशाब का रिसाव **तनाव मूत्र असंयम (SUI)** कहलाता है, जो अक्सर प्रोस्टेट सर्जरी के बाद होता है। AUS में तीन जुड़े हुए हिस्से होते हैं, सब त्वचा के नीचे:

- मूत्रमार्ग के चारों ओर एक नरम **cuff** जो इसे धीरे से बंद रखती है ताकि आप सूखे रहें
- अंडकोष में एक **pump** जिसे आप पेशाब करने के लिए दबाते हैं
- पेट के निचले हिस्से में एक छोटा **balloon** जो दबाव नियंत्रित करता है

इसे कैसे उपयोग करें: सामान्यतः cuff बंद रहती है और आप सूखे रहते हैं। जब पेशाब जाना हो, pump को कुछ बार दबाएँ — cuff खुल जाती है और आप पेशाब कर सकते हैं। कुछ मिनट बाद यह अपने आप भर जाती है और बंद हो जाती है।

क्या यह सुरक्षित है?

AUS इस प्रकार के रिसाव का सर्वोत्तम और सिद्ध इलाज है; अधिकांश पुरुषों को बहुत अच्छा नियंत्रण मिलता है। किसी भी implant की तरह कुछ जोखिम हैं — मुख्यतः संक्रमण, या समय के साथ उपकरण या मूत्रमार्ग पर घिसाव जिसके लिए बाद में मरम्मत की जरूरत हो सकती है। आपकी टीम antibiotics, sterile तकनीक, और पहले से किसी भी मूत्र संक्रमण का इलाज करके इस जोखिम को कम करती है।

शब्दों को समझें

तनाव मूत्र असंयम (SUI)

गतिविधि, खाँसी, या भारी उठाने पर पेशाब का रिसाव।

मूत्रमार्ग (Urethra)

वह नली जिससे पेशाब शरीर से बाहर आता है।

Cuff

उपकरण का वह हिस्सा जो मूत्रमार्ग को धीरे से बंद रखता है।

Pump

अंडकोष में स्थित हिस्सा जिसे आप cuff खोलने और पेशाब करने के लिए दबाते हैं।

Activation

सर्जरी के लगभग 6 हफ्ते बाद क्लिनिक में उपकरण को चालू करना।

Deactivation

उपकरण को बंद करना (cuff खुली रखना) — किसी भी catheter से पहले जरूरी।

जनरल एनेस्थीसिया

दवा जो सर्जरी के दौरान आपको सोए रखती है।

Cystoscopy

सर्जरी से पहले मूत्रमार्ग और मूत्राशय की camera जाँच।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल या spinal एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए आपको कुछ महसूस नहीं होता। बाद में अंडकोष और उसके आसपास 1-2 हफ्ते तक दर्द, सूजन, और नील रह सकते हैं — scrotal support, बर्फ, और दर्द की दवा से राहत मिलती है। सर्जरी लगभग 1-2 घंटे की होती है और अधिकांश लोग उसी दिन घर जा सकते हैं।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- यह **जनरल या spinal एनेस्थीसिया** में होती है — सभी निर्देशों का पालन करें (खाली पेट रहना, और कौन-सी दवाएँ, जैसे blood thinners, बंद करनी हैं)।
- एक **मूत्र जाँच (urine test)** संक्रमण देखने के लिए की जाती है — संक्रमण पहले ठीक होना चाहिए; यदि हो तो सर्जरी टल सकती है।
- **धूम्रपान या vaping न करें**; दिए गए **antiseptic soap** से नहाएँ और antibiotics निर्देशानुसार लें — यह एक implant है, इसलिए संक्रमण रोकना सबसे जरूरी है।

अपनी टीम को पहले से बताएँ यदि आपको:

- पेल्विस में **radiation** हुई हो, या पहले मूत्रमार्ग या असंयम की सर्जरी हुई हो
- **मधुमेह (diabetes)** हो, या हार्थों से काम करने में कठिनाई हो (pump आप खुद दबाते हैं)
- कहीं भी कोई संक्रमण हो

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में सोए या कमर से नीचे सुन्न रहते हैं, और antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 छोटे चीरों से सर्जन मूत्रमार्ग के चारों ओर **cuff**, पेट में **balloon**, और अंडकोष में **pump** लगाते हैं — सब त्वचा के नीचे।
- 3 उपकरण भरा और जाँचा जाता है, फिर ठीक होने के लिए **बंद छोड़ दिया जाता है**।

बाद में

- 1-2 हफ्ते तक अंडकोष में **सूजन और नील** रहेंगे। Scrotal support पहनें, बर्फ लगाएँ, और सर्जन की सलाह तक **भारी उठाना, जोर लगाना, cycling, और संबंध न बनाएँ**।
- **उपकरण लगभग 6 हफ्ते बंद रहेगा**। तब तक रिसाव जारी रहेगा — यह सामान्य है। **Pump न दबाएँ** जब तक सर्जन इसे चालू न करें।
- लगभग **6 हफ्ते बाद के दौरे पर सर्जन उपकरण चालू करते हैं** और pump उपयोग करना सिखाते हैं।
- **किसी भी doctor को बताएँ कि आपके पास AUS है** — कोई भी catheter से पहले इसे बंद करना जरूरी है, वरना मूत्रमार्ग को नुकसान हो सकता है। Medical-alert card साथ रखें।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार, ठंड लगना, या चीरे पर बढ़ती लालिमा, दर्द, या साव
- अचानक पेशाब बिल्कुल बंद हो जाए
- अंडकोष बहुत सूज जाए, सख्त हो जाए, या दर्द बढ़ता जाए

याद रखने योग्य तीन बातें

1. AUS एक छिपा हुआ उपकरण है जो मूत्राशय नियंत्रण लौटाता है — cuff आपको सूखा रखती है, और पेशाब के लिए अंडकोष में pump दबाते हैं।
2. यह **लगभग 6 हफ्ते बंद रहता है** (तब भी रिसाव होगा — यह सामान्य है), फिर इसे चालू करके उपयोग सिखाया जाता है।
3. संक्रमण रोकना सबसे जरूरी है: पहले संक्रमण ठीक करें, धूम्रपान न करें, antiseptic wash और antibiotics का उपयोग करें। **किसी भी doctor को बताएँ कि AUS है — catheter से पहले इसे बंद करना जरूरी है।**