

गाल की झिल्ली का ग्राफ्ट (Buccal Mucosa Graft)

WARWIKI

रोगी जानकारी · मूत्रमार्ग या मूत्रवाहिनी के पुनर्निर्माण में उपयोग होने वाला गाल का ग्राफ्ट

आपकी पुनर्निर्माण सर्जरी के दौरान, आपका सर्जन आपके गाल के अंदरूनी हिस्से की नम झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा — buccal mucosa graft — लेकर आपके मूत्रमार्ग (या कभी-कभी मूत्रवाहिनी) को दोबारा बनाता है। यह जानकारी बताती है कि गाल का उपयोग क्यों किया जाता है, सर्जरी में क्या होता है, और आपका मुँह कैसे ठीक होगा।

इस ग्राफ्ट के बारे में

आपके गाल का अंदरूनी हिस्सा एक मज़बूत, नम ऊतक से ढका होता है जो मूत्र मार्ग के लिए बहुत उपयुक्त है। एक पतला अंडाकार टुकड़ा एक गाल से (लंबी मरम्मत के लिए कभी-कभी दोनों गालों से) लिया जाता है और संकरे हिस्से को चौड़ा करने या दोबारा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह ग्राफ्ट आपके मूत्रमार्ग की सर्जरी के दौरान ही, जब आप बेहोश होते हैं, लिया जाता है।

गाल का उपयोग क्यों?

- यह बालरहित और नम होता है — मूत्र मार्ग जैसा ही वातावरण
- यह मज़बूत है, जल्दी ठीक होता है, और संक्रमण से लड़ता है
- इसे उसी सर्जरी के दौरान लिया जाता है — शरीर पर कोई अलग कट नहीं, कोई दिखने वाला निशान नहीं

क्या यह सुरक्षित है?

हाँ। गाल का ग्राफ्ट लेना मूत्रमार्ग सर्जरी का एक स्थापित और सहनीय हिस्सा है, जिसमें मरीजों की संतुष्टि बहुत अधिक है। सर्जन लार की नली और मुँह के कोने से दूर रहता है। अधिकतर प्रभाव मुँह तक सीमित होते हैं — दर्द, तनाव, या सुन्नपन — जो पहले 1-2 हफ्तों में कम हो जाते हैं।

शब्दों को समझें

Buccal mucosa

गाल के अंदर की नम झिल्ली।

Graft (ग्राफ्ट)

आपके अपने ऊतक का एक टुकड़ा जो किसी दूसरे हिस्से की मरम्मत के लिए लिया जाता है।

मूत्रमार्ग (Urethra)

वह नली जो शरीर से पेशाब बाहर ले जाती है।

Urethroplasty

मूत्रमार्ग की मरम्मत या पुनर्निर्माण की सर्जरी; ग्राफ्ट इसी का हिस्सा है।

Donor site

जहाँ से ग्राफ्ट लिया जाता है — यहाँ, आपके गाल का अंदरूनी भाग।

जनरल एनेस्थीसिया

दवा जो सर्जरी के दौरान आपको बेहोश और दर्द-मुक्त रखती है।

लार की नली (Parotid duct)

गाल के अंदर एक छोटा मुँह जो लार निकालता है; सर्जन इससे दूर रहता है।

Trismus

मुँह पूरा खोलने में अस्थायी कठिनाई; हल्के खिंचाव से ठीक हो जाती है।

क्या इसमें दर्द होगा? ग्राफ्ट जनरल एनेस्थीसिया में लिया जाता है, इसलिए सर्जरी के दौरान आपको कुछ महसूस नहीं होगा। बाद में गाल में दर्द होगा — जैसे गाल काटने या मुँह के छाले जैसा — और तनाव या सुन्नपन भी हो सकता है। दर्द पहले 1-2 हफ्तों में कम हो जाता है। ज़्यादातर लोग एक दिन में तरल पदार्थ और एक हफ्ते में सामान्य खाना खाने लगते हैं।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- ग्राफ्ट आपकी मुख्य सर्जरी के दौरान **जनरल एनेस्थीसिया** में लिया जाता है — सामान्य सर्जरी निर्देशों का पालन करें (खाली पेट रहना, कौन सी दवाएँ बंद करनी हैं)।
- **मुँह की देखभाल करें** — ब्रश करें और कुल्ला करें; टीम दाँतों की सफाई पहले करवाने को कह सकती है।
- **धूम्रपान, vaping या तंबाकू से बचें** — इससे मुँह और ग्राफ्ट का ठीक होना धीमा पड़ता है।

अपनी चिकित्सा टीम को पहले से बताएँ यदि:

- मुँह, गाल, या जबड़े की सर्जरी या सिर-गर्दन में radiation हो चुकी हो
- मुँह की कोई बीमारी हो, या मुँह पूरा खोलने में दिक्कत हो
- तंबाकू, गुटखा, या पान चबाते हों, या दाँतों की समस्या हो

सर्जरी के दौरान क्या होता है

1. पूरी सर्जरी के दौरान आप जनरल एनेस्थीसिया में बेहोश रहते हैं और आपका मुँह धीरे से खुला रखा जाता है।
2. सर्जन एक गाल से (लंबी मरम्मत के लिए दोनों से) एक पतला अंडाकार टुकड़ा निकालता है, लार की नली और मुँह के कोने से दूर रहता है।
3. ग्राफ्ट को आकार देकर मूत्र मार्ग के संकरे हिस्से को चौड़ा करने या दोबारा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
4. गाल को आमतौर पर अपने आप ठीक होने के लिए छोड़ दिया जाता है, या घुलने वाले टाँकों से बंद किया जाता है।

बाद में (आपका मुँह)

- **ठीक होना दो चरणों में:** दर्द और तनाव **पहले 1-2 हफ्तों में कम होते हैं**, लेकिन गाल लगभग एक महीने तक ठीक होता रहता है; **सुन्नपन एक महीने या अधिक** लग सकता है।
- पहले **नरम, सादा खाना** खाएँ; मसालेदार, खट्टा, बहुत गर्म, कुरकुरा खाना और alcohol से बचें। खाने के बाद हल्के से कुल्ला करें।
- रोज़ाना **मुँह को धीरे-धीरे खोलने का अभ्यास** करें। **कोई दिखने वाला निशान नहीं** — ग्राफ्ट मुँह के अंदर से लिया जाता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- मुँह से अधिक या लगातार रक्तस्राव
- मुँह का दर्द, सूजन, या पस बढ़ना (संक्रमण)
- तरल पदार्थ पीने में या मुँह बिल्कुल न खुलने में परेशानी

याद रखने योग्य तीन बातें

1. गाल के अंदर की नम झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा मूत्रमार्ग को दोबारा बनाने के लिए उपयोग होता है — यह बालरहित है, जल्दी ठीक होती है, और कोई दिखने वाला निशान नहीं छोड़ती।
2. यह मूत्रमार्ग की सर्जरी के दौरान ही लिया जाता है। तैयारी के लिए: खाली पेट और दवा संबंधी निर्देश मानें, मुँह की देखभाल करें, और धूम्रपान न करें।
3. गाल में दर्द, तनाव या सुन्नपन होगा — यह **1-2 हफ्तों में कम होता है लेकिन पूरी तरह ठीक होने में एक महीने या अधिक लग सकता है**। नरम खाना खाएँ, हल्के से कुल्ला करें, और रोज़ मुँह खोलने का अभ्यास करें। बुखार, अधिक रक्तस्राव, या बढ़ती सूजन पर तुरंत संपर्क करें।