

कॉन्टिनेंट कटेनियस डायवर्शन (इंडियाना पाउच)

रोगी जानकारी · एक आंतरिक पाउच जिसे आप catheter से खाली करते हैं — कोई बैग नहीं

WARWIKI

कॉन्टिनेंट कटेनियस डायवर्शन आपकी अपनी आँत से बना एक आंतरिक पाउच है जो मूत्र (पेशाब) को शरीर के अंदर रोकता है। इसमें एक छोटा, leak-proof उद्घाटन (stoma, अक्सर नाभि में) होता है। बैग पहनने की जगह, आप दिन में कई बार catheter से पाउच खाली करते हैं। इंडियाना पाउच इसका सबसे सामान्य प्रकार है।

इस प्रक्रिया के बारे में

बड़ी और छोटी आँत के एक हिस्से को पेट के अंदर एक कम-दबाव वाले **reservoir (पाउच)** में बदला जाता है; गुर्दों से मूत्रवाहिनियाँ (ureters) इसमें जुड़ती हैं। एक छोटी नली जिसमें **one-way valve** होता है, त्वचा पर लाई जाती है — अक्सर **नाभि** पर — एक छोटे, flat stoma के रूप में जो catheterization के बीच सूखा रहता है।

- आप पाउच को खाली करने के लिए **हर 4-6 घंटे** में catheter डालते हैं।
- आप mucus साफ़ करने के लिए पाउच को **flush (irrigate)** करते हैं।
- **कोई बैग नहीं** — stoma पर बस एक छोटा पैड या पट्टी।

यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो बैग नहीं चाहते, neobladder के लिए उपयुक्त नहीं हैं, और **नियमित रूप से catheterize** कर सकते हैं — जिसके लिए स्थिर हाथ और दृष्टि, या एक सहायक देखभालकर्ता ज़रूरी है।

क्या यह सुरक्षित है?

यह एक स्थापित विकल्प है। यह conduit से बड़ा और लंबा ऑपरेशन है, और जीवनभर catheterize करना पड़ता है। जोखिमों में शामिल हैं: रक्तस्राव, संक्रमण, leak; catheter डालने में कठिनाई या stoma का सिकुड़ना/रिसाव (कभी-कभी छोटी प्रक्रिया ज़रूरी); पाउच में पथरी, mucus, UTI; और दीर्घकालिक नमक/विटामिन/गुर्दों के बदलाव (follow-up में देखे जाते हैं)।

शब्दों को समझें

Continent diversion

एक मूत्र प्रणाली जो leak-proof रहती है — आप तय करते हैं कब खाली करना है।

इंडियाना पाउच

सबसे सामान्य continent पाउच, दाहिनी बड़ी आँत और छोटी आँत से बना।

Reservoir (पाउच)

आँत से बना आंतरिक थैला जो मूत्र रखता है।

Stoma

त्वचा पर छोटा उद्घाटन (अक्सर नाभि) जिससे catheter डाला जाता है।

Catheterize

पाउच खाली करने के लिए stoma में पतली नली डालना।

Irrigate

mucus साफ़ करने के लिए पानी से पाउच धोना।

Ureters (मूत्रवाहिनियाँ)

गुर्दों से मूत्र लाने वाली नलियाँ; ये पाउच में जुड़ती हैं।

Mucus

आँत से निकलने वाला तरल; नियमित सफाई ज़रूरी है।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में पेट में दर्द होता है और आँत को काम शुरू करने में कुछ दिन लगते हैं। आप पाउच में एक tube (और soft stents) के साथ उठते हैं जो ठीक होने तक लगभग 3-4 हफ्ते रहती है — आप mucus साफ़ करने के लिए इसे flush करते हैं। अधिकांश लोग लगभग 5-8 दिन अस्पताल में रहते हैं।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- **जनरल एनेस्थीसिया** में होती है — सभी निर्देश मानें (उपवास, blood thinners बंद करें जैसा कहा जाए)। आपको **bowel prep** भी करना पड़ सकता है।
- आपकी टीम **stoma की जगह** (अक्सर नाभि) तय करेगी और पुष्टि करेगी कि आप — या कोई सहायक — **जीवनभर catheterize** कर सकते हैं।
- **धूम्रपान न करें** और घर पर मदद का इंतज़ाम करें।

अपनी टीम को पहले से बताएँ यदि आप:

- **blood thinner** लेते हैं, या अभी कोई संक्रमण है
- **आँत की बीमारी**, गुर्दे की समस्या, या catheterize करने में कोई **हाथ या दृष्टि** की कठिनाई है

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में सो जाते हैं और antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 आँत का एक हिस्सा अलग किया जाता है और बाकी आँत को जोड़ा जाता है।
- 3 आँत को पाउच के रूप में बनाया जाता है और one-way valve वाली नली को stoma के रूप में त्वचा पर लाया जाता है।
- 4 ureters जोड़े जाते हैं; ठीक होने के दौरान पाउच में tube और soft stents रखे जाते हैं।

बाद में

- आप लगभग **5-8 दिनों** में घर जाते हैं; **पाउच की tube ~3-4 हफ्ते** रहती है; mucus साफ़ करने के लिए नियमित flush करें।
- tube निकलने और पाउच ठीक होने के बाद, आप **हर 4-6 घंटे में stoma catheterize** करते हैं और mucus साफ़ करने के लिए irrigate करते हैं।
- stoma **सूखा** रहता है — इस पर छोटा पैड या पट्टी (कोई बैग नहीं)।
- Mucus सामान्य है; तरल पदार्थ पीते रहें; जीवनभर follow-up (विटामिन B12, पाउच जाँच)। **~6 हफ्ते भारी सामान न उठाएँ।**

यदि आपको ये हों तो तुरंत अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- **catheter न डाल सकें या पेशाब न आए** — पाउच भर सकता है, तुरंत खाली करना ज़रूरी है
- बुखार या ठंड लगना
- तेज़ पेट दर्द, उल्टी, या **गैस/मल न आना**
- अधिक रक्तस्राव, catheter में clot, या घाव में लालिमा/साव

याद रखने योग्य तीन बातें

1. इंडियाना पाउच मूत्र शरीर के अंदर रखता है; एक छोटे leak-proof stoma से catheter द्वारा खाली करते हैं — कोई बैग नहीं।
2. जीवनभर हर 4-6 घंटे में catheterize और mucus साफ़ करने के लिए irrigate करना होगा — स्थिर हाथ/दृष्टि या सहायक ज़रूरी।
3. उपवास और bowel prep करें, धूम्रपान न करें, मदद का इंतज़ाम करें। catheter न डाल सकें तो तुरंत देखभाल लें।