

सिस्टोग्राम मूत्राशय (bladder) का एक छोटा X-ray test है। Catheter के ज़रिए मूत्राशय में एक विशेष dye भरी जाती है जो X-ray में स्पष्ट दिखती है। इससे आपका सर्जन देख सकता है कि repair ठीक हुई है और कहीं leak तो नहीं है, या कोई असामान्य जुड़ाव या गुर्दे की ओर वापसी (reflux) तो नहीं है।

इस जाँच के बारे में

साधारण X-ray में मूत्राशय ठीक से नहीं दिखता। सिस्टोग्राम में **contrast dye** भरी जाती है जो सफ़ेद दिखती है, जिससे मूत्राशय की आकृति और उसका कार्य देखा जा सकता है। आपका सर्जन यह test इन कारणों से कर सकता है:

- **सर्जिकल repair का ठीक होना** — अक्सर catheter हटाने से पहले leak तो नहीं है
- चोट या सर्जरी के बाद **leak** की जाँच
- मूत्राशय और किसी अन्य अंग के बीच असामान्य जुड़ाव (**फिस्टुला**) का पता लगाना
- मूत्र का गुर्दों की ओर वापस बहना (**reflux**) जाँचना

Dye जाने का तरीका आपकी स्थिति पर निर्भर है:

- यदि **कोई tube नहीं है**, तो test के लिए एक छोटा catheter लगाया जाएगा।
- यदि पहले से **urethral catheter** या **suprapubic tube** है, तो dye उसी से जाती है — नई tube की ज़रूरत नहीं।

क्या यह सुरक्षित है?

हाँ। सिस्टोग्राम एक सामान्य, कम जोखिम वाला test है। X-ray की मात्रा कम होती है और पानी आधारित dye पेशाब के साथ निकल जाती है। अधिकतर लोगों को केवल भरेपन या हल्के दबाव का अहसास होता है। कभी-कभी UTI, हल्की जलन, या ऐंठन हो सकती है जो आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है।

शब्दों को समझें

सिस्टोग्राम

Dye भरकर लिया गया मूत्राशय का X-ray।

मूत्राशय (Bladder)

वह मांसपेशी थैली जो पेशाब करने तक मूत्र संग्रहीत करती है।

Contrast dye

एक तरल पदार्थ जो X-ray में सफ़ेद दिखता है।

Catheter

मूत्राशय में dye भरने के लिए उपयोग की जाने वाली पतली, मुलायम tube।

Suprapubic tube

पेट के निचले हिस्से से मूत्राशय निकासी करने वाला catheter; इससे dye डाली जा सकती है।

फिस्टुला (Fistula)

मूत्राशय और किसी अन्य अंग के बीच असामान्य जुड़ाव।

Reflux

मूत्राशय से गुर्दों की ओर मूत्र का वापस बहना।

Voiding images

पेशाब करते समय लिए गए अतिरिक्त X-ray चित्र।

क्या इसमें दर्द होगा? अधिकतर लोगों को मूत्राशय भरते समय केवल भरेपन या हल्के दबाव का अहसास होता है, तेज़ दर्द नहीं। यदि test के लिए catheter लगाया जाए तो थोड़ी जलन हो सकती है। Team किसी भी समय धीमा कर सकती है — बस बताएँ। Test आमतौर पर 15-30 मिनट का होता है।

तैयारी कैसे करें (Test से पहले)

तैयारी बहुत कम है। अधिकतर मामलों में:

- जब तक अन्यथा न कहा जाए, **सामान्य खाना-पीना** और **रोज़ की दवाएँ** लेते रहें।
- यदि catheter या suprapubic tube है, तो उसे **लगा रहने दें** — dye उसी से जाएगी।
- Sedation नहीं होता, इसलिए आप आमतौर पर **खुद गाड़ी चलाकर घर** जा सकते हैं।

पहले से अपनी टीम को बताएँ यदि आप:

- X-ray contrast dye या iodine से कभी reaction हुआ हो
- Blood thinner दवा लेते हों
- UTI के लक्षण हों (जलन, बुखार, या बदबूदार-धुंधला पेशाब) — active infection में test टल सकता है

Test के दौरान क्या होता है

- आप X-ray table पर लेटते हैं। यदि tube नहीं है तो छोटा catheter धीरे से लगाया जाता है; यदि है तो उससे जोड़ा जाता है।
- X-ray चित्र लेते हुए dye धीरे-धीरे मूत्राशय में भरी जाती है। स्थिर रहने और सामान्य सांस लेने को कहा जा सकता है।
- ज़रूरत होने पर आपको **पेशाब करने** को कहा जा सकता है ताकि मूत्राशय खाली होते हुए चित्र लिए जा सकें।
- चित्र देखे जाते हैं और catheter हटा दिया जाता है — या मौजूदा tube लगी रहती है।

बाद में

- आप आमतौर पर घर जा सकते हैं और **सामान्य गतिविधियाँ** तुरंत शुरू कर सकते हैं।
- एक-दो दिन पेशाब करते समय **हल्की जलन** हो सकती है। अधिक पानी पीने से यह जल्दी ठीक होती है।
- थोड़े समय के लिए पेशाब में **हल्का गुलाबी रंग** दिख सकता है, जो सामान्य है और एक दिन में ठीक हो जाता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- पेशाब करने में परेशानी, या बिल्कुल न हो पाना
- अधिक रक्तस्राव, या पेशाब में blood clots
- दर्द या पेट की ऐंठन जो बेहतर होने की बजाय बढ़ रही हो

याद रखने योग्य तीन बातें

- सिस्टोग्राम एक त्वरित, सुरक्षित X-ray है जो मूत्राशय में dye भरकर repair, leak, फिस्टुला या reflux जाँचता है।
- तैयारी बहुत कम है। Catheter या suprapubic tube लगी रहने दें; dye allergy, blood thinner या UTI के लक्षण पहले बताएँ।
- अधिकतर लोगों को केवल भरेपन का अहसास होता है और वे तुरंत घर जाते हैं। हल्की जलन या एक दिन गुलाबी पेशाब सामान्य है — अधिक पानी पिएँ; बुखार, अधिक रक्तस्राव, या पेशाब न होने पर call करें।