

योनि हिस्टेरेक्टॉमी (प्रोलैप्स के लिए)

WARWIKI

रोगी जानकारी · योनि के रास्ते गर्भाशय निकालना, और ऊपरी योनि को सहारा देना

जब पेल्विक अंग प्रोलैप्स के कारण गर्भाशय नीचे खिसक जाता है, तो एक विकल्प है योनि हिस्टेरेक्टॉमी — गर्भाशय को पूरी तरह योनि के रास्ते निकालना, पेट पर कोई चीरा नहीं। इसके साथ लगभग हमेशा योनि के ऊपरी हिस्से की **suspension** (और अक्सर अन्य मरम्मत) की जाती है ताकि बाद में अच्छा सहारा रहे।

इस सर्जरी के बारे में

गर्भाशय को अलग करके योनि के रास्ते निकाला जाता है। फिर **योनि के ऊपरी हिस्से को आपके अपने मज़बूत पेल्विक ligaments से जोड़कर** सहारा दिया जाता है ताकि दोबारा प्रोलैप्स न हो। जाँच के अनुसार आगे या पीछे की दीवार की मरम्मत भी की जा सकती है। योनि के रास्ते की सर्जरी में आमतौर पर पेट की सर्जरी से **कम दर्द और जल्दी ठीक होने** का फायदा होता है।

ज़रूरी बातें

- गर्भाशय निकालने से मासिक धर्म बंद हो जाता है और गर्भधारण संभव नहीं रहता।
- अगर प्रोलैप्स मुख्यतः गर्भाशय का है और आप **गर्भाशय रखना** चाहती हैं, तो uterus-sparing suspension (hysteropexy) का विकल्प हो सकता है — अपने सर्जन से पूछें।
- ज़रूरत पड़े तो **पेशाब रिसाव** के लिए अलग प्रक्रिया भी साथ में की जा सकती है।

शब्दों को समझें

Hysterectomy

गर्भाशय निकालने की सर्जरी।

Vaginal route

योनि के रास्ते की जाती है, पेट पर कोई चीरा नहीं।

Vault suspension

योनि के ऊपरी हिस्से को दोबारा सहारा देना।

Hysteropexy

गर्भाशय रखते हुए उसे ऊपर टिकाने का विकल्प।

प्रोलैप्स (Prolapse)

जब पेल्विक अंग नीचे खिसककर दबाव या उभार बनाते हैं।

Vaginal packing

सर्जरी के बाद कुछ समय के लिए योनि में रखी जाने वाली पट्टी।

क्या इसमें दर्द होगा? एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसलिए दौरान कुछ महसूस नहीं होता। पेट पर चीरा नहीं होने से ठीक होना आसान रहता है — हल्का-से-मध्यम दर्द, और अधिकतर लोग उसी दिन या एक रात बाद घर जाते हैं।

तैयारी कैसे करें

- **एनेस्थीसिया के निर्देशों का पालन करें** (खाली पेट रहना, blood thinners बताए अनुसार बंद करें)।
- Pre-op जाँच होगी; अपने सर्जन से पूछें कि कौन-सी अन्य मरम्मत या anti-leakage प्रक्रिया साथ होगी।
- धूम्रपान न करें; घर जाने और देखभाल के लिए किसी का इंतज़ाम करें।

क्या होता है

- 1 आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है; antibiotics दी जाती हैं।
- 2 गर्भाशय को अलग करके **योनि के रास्ते** निकाला जाता है।
- 3 योनि के ऊपरी हिस्से को ligaments से **जोड़कर सहारा** दिया जाता है; अन्य मरम्मत योजना के अनुसार की जाती है।
- 4 कुछ समय के लिए catheter और कभी-कभी vaginal pack रखा जाता है।

बाद में

- कुछ हफ्तों तक हल्का spotting/discharge सामान्य है क्योंकि योनि का ऊपरी हिस्सा ठीक होता है।
- **लगभग 6 हफ्ते तक भारी वज़न उठाने, ज़ोर लगाने और sex से परहेज करें।**
- मल को नरम रखें; आराम करें, फिर धीरे-धीरे गतिविधि बढ़ाएँ।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना, या अधिक रक्तस्राव
- **पेशाब न आना**, या पेल्विक/पेट का दर्द बढ़ना
- बदबूदार discharge, या योनि से कुछ निकलना

याद रखने योग्य तीन बातें

1. योनि हिस्टेरेक्टॉमी में योनि के रास्ते गर्भाशय निकाला जाता है (पेट पर चीरा नहीं) और योनि के ऊपरी हिस्से को सहारा दिया जाता है।
2. मासिक धर्म और गर्भधारण बंद हो जाते हैं; गर्भाशय रखना हो तो uterus-sparing suspension के बारे में पूछें।
3. ~6 हफ्ते भारी वज़न और sex से परहेज करें; spotting सामान्य है। बुखार, अधिक रक्तस्राव, या पेशाब में दिक्कत हो तो तुरंत बुलाएँ।