

योनि सस्पेंशन सर्जरी योनि के ऊपरी हिस्से या गर्भाशय के प्रोलैप्स को ठीक करती है — आपके अपने मज़बूत पेल्विक लिगामेंट से दोबारा जोड़कर। इसमें आपका अपना ऊतक इस्तेमाल होता है, कोई mesh नहीं। यह पूरी तरह योनि के रास्ते की जाती है, पेट पर कोई चीरा नहीं होता।

इस प्रक्रिया के बारे में

योनि के ऊपरी हिस्से को पेल्विस के एक मज़बूत लिगामेंट से टाँके लगाकर ऊपर रखा जाता है। दो सामान्य तरीके हैं:

- **यूटेरोसेक्रल लिगामेंट सस्पेंशन (USLS)** — पेल्विस के अंदर गहरे यूटेरोसेक्रल लिगामेंट से जोड़ा जाता है
- **सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन (SSLF)** — बगल की ओर सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट से जोड़ा जाता है

दोनों में **आपका अपना ऊतक** (स्थायी टाँके) उपयोग होता है — कोई mesh नहीं। इन्हें अक्सर आगे या पीछे की दीवार की मरम्मत के साथ, और गर्भाशय निकालने के समय भी किया जाता है।

तुलना

सेक्रोकोल्पोपेक्सी (जो पेट के mesh से योनि को ऊपर करती है) की तुलना में, योनि सस्पेंशन में mesh और पेट का चीरा नहीं होता; सेक्रोकोल्पोपेक्सी थोड़ी अधिक टिकाऊ हो सकती है। आपके सर्जन दोनों के फायदे-नुकसान समझाएँगे।

शब्दों को समझें

Apex / vault

योनि का ऊपरी हिस्सा, जो प्रोलैप्स में नीचे आ सकता है।

Suspension

योनि के ऊपरी हिस्से को मज़बूत लिगामेंट से दोबारा जोड़ना।

USLS

यूटेरोसेक्रल लिगामेंट सस्पेंशन।

SSLF

सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन।

Native tissue

आपका अपना ऊतक — इस मरम्मत में कोई mesh नहीं।

Vault prolapse

योनि का ऊपरी हिस्सा नीचे खिसकना, अक्सर hysterectomy के बाद।

क्या इसमें दर्द होगा? एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए दौरान कुछ महसूस नहीं होता और पेट पर कोई चीरा नहीं। SSLF में कुछ लोगों को कुछ दिनों से हफ्तों तक **नितंब या जाँघ में हल्की तकलीफ** हो सकती है — यह अपने आप ठीक हो जाती है।

तैयारी कैसे करें

- **एनेस्थीसिया के निर्देश** मानें (उपवास, blood thinner बताए अनुसार बंद करें)।
- प्री-ऑप जाँच होगी; अन्य मरम्मत या leak रोकने की प्रक्रिया साथ हो सकती है।
- धूम्रपान न करें; घर वापसी और देखभाल की व्यवस्था करें।

क्या होता है

- 1 एनेस्थीसिया दी जाती है; antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 योनि के रास्ते, ऊपरी हिस्से को पेल्विक लिगामेंट से टाँके लगाए जाते हैं।
- 3 योजना अनुसार दीवार की अतिरिक्त मरम्मत की जाती है।
- 4 एक catheter और कभी-कभी योनि में पैक थोड़ी देर के लिए रखा जाता है।

बाद में

- उसी दिन या एक रात बाद घर; हल्का spotting/discharge सामान्य है।
- **लगभग 6 हफ्ते तक भारी सामान उठाना, जोर लगाना और सेक्स से बचें।**
- SSLF में नितंब की तकलीफ कुछ हफ्तों में कम होती है; मल नरम रखें।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना, या अधिक रक्तस्राव
- **पेशाब न हो सके**, या पेल्विक दर्द बढ़े
- **नितंब/पैर में तेज़ या तीखा दर्द**, या नई सुन्नता

याद रखने योग्य तीन बातें

1. योनि सर्पेंशन आपके अपने लिगामेंट से योनि के ऊपरी हिस्से को उठाती है — टिकाऊ, mesh-free, योनि के रास्ते।
2. USLS और SSLF दो मुख्य तरीके हैं; सेक्रोकोल्पोपेक्सी mesh/पेट वाला विकल्प है।
3. 6 हफ्ते भारी काम और सेक्स से बचें। SSLF में हल्की नितंब तकलीफ हो सकती है; बुखार, अधिक रक्तस्राव या तेज़ दर्द पर तुरंत बुलाएँ।