

Цистоскопия позволяет врачу осмотреть уретру и мочевой пузырь изнутри с помощью тонкого гибкого инструмента с миниатюрной камерой и источником света, вводимого через естественное отверстие мочеиспускательного канала. Исследование помогает выявить причину крови в моче, инфекций, стриктур и других проблем — а также проверить результат лечения.

Об этом исследовании

Цистоскоп — тонкая трубка с камерой на конце. Существует два вида:

- **Гибкий цистоскоп** обычно применяется в кабинете врача в сознании пациента; используется обезболивающий гель.
- **Жёсткий цистоскоп** используется в операционной под анестезией и позволяет одновременно выполнить лечебные манипуляции.

В мочевой пузырь подают стерильную жидкость, чтобы расправить его стенки для осмотра. Врач может назначить цистоскопию для:

- Выяснения причины **крови в моче** или повторных инфекций
- Поиска **стриктуры (сужения)**, камня или образования
- Контроля заживления после лечения или взятия биопсии
- Установки, проверки или удаления **стента** или шва

Это безопасно?

Да. Цистоскопия — одна из наиболее распространённых урологических процедур и несёт минимальный риск. Большинство пациентов испытывают лишь кратковременный дискомфорт. Редкие нежелательные явления — инфекция мочевыводящих путей (UTI), небольшое кровотечение или кратковременное жжение — как правило, незначительны и проходят быстро.

ТЕРМИНЫ

Цистоскоп

Тонкий инструмент с камерой и источником света для осмотра мочевого пузыря изнутри.

Мочевой пузырь

Мышечный орган, накапливающий мочу до мочеиспускания.

Уретра

Канал, по которому моча выводится из организма.

Гибкий / жёсткий

Гибкий — для осмотра в сознании в кабинете; жёсткий — в операционной под анестезией.

Обезболивающий гель

Местный анестетик, вводимый в уретру для комфортного прохождения инструмента.

Биопсия

Небольшой кусочек ткани, взятый для изучения под микроскопом.

Стент

Мягкая трубка, удерживающая просвет открытым; может быть установлена или удалена во время процедуры.

Остаточная моча

Объём мочи, остающийся в пузыре после мочеиспускания.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? При использовании гибкого цистоскопа вы можете почувствовать кратковременное давление или жжение при введении инструмента — обезболивающий гель снижает дискомфорт, и осмотр обычно занимает несколько минут. При использовании жёсткого цистоскопа вы находитесь под анестезией и ничего не ощущаете. Сообщайте врачу, если вам дискомфортно.

Как подготовиться (До исследования)

- При **амбулаторной (гибкой)** цистоскопии обычно можно **есть, пить и принимать привычные лекарства**; добраться домой самостоятельно.
- При цистоскопии **под анестезией** соблюдайте инструкции по подготовке к операции: голодание, ограничения по приёму лекарств, организуйте сопровождение домой.
- Вас могут попросить сдать **анализ мочи** для исключения инфекции; возможно, будет назначен **антибиотик**.

Сообщите врачу заранее, если вы:

- Принимаете **антикоагулянты**
- Имеете признаки **инфекции мочевыводящих путей** (жжение, жар, мутная моча с резким запахом) — при активной инфекции исследование может быть перенесено
- Имеете аллергии или стриктуру, затруднявшую проведение инструмента ранее

Что происходит во время исследования

- 1 Вы удобно ложитесь, медперсонал помогает принять нужное положение. Область обрабатывается, в уретру вводится обезболивающий гель.
- 2 Цистоскоп мягко проводится через уретру в мочевой пузырь.
- 3 Подаётся стерильная жидкость для расправления пузыря; врач осматривает его стенки по всей окружности.
- 4 Инструмент извлекается. При необходимости до извлечения выполняются лечебные манипуляции, биопсия или замена стента.

После исследования

- После амбулаторного осмотра можно сразу вернуться к **обычной деятельности**; после анестезии необходим отдых и сопровождение домой.
- В течение суток возможно **лёгкое жжение при мочеиспускании**. Обильное питьё помогает промыть мочевыводящие пути и уменьшает дискомфорт.
- Возможно кратковременное **розоватое окрашивание мочи** — это норма; как правило, проходит в течение суток.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Жар или озноб
- Затруднённое мочеиспускание или полная его невозможность
- Сильное кровотечение или сгустки крови в моче
- Боль, которая усиливается, а не проходит

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Цистоскопия — быстрый и безопасный осмотр мочевого пузыря и уретры тонкой камерой: помогает выявить проблему или проверить результат лечения.
2. Для осмотра в кабинете подготовка не нужна; при анестезии — голодание и сопровождение. Сообщите об антикоагулянтах и признаках инфекции.
3. Лёгкое жжение и розоватая моча в течение суток — норма. Пейте больше воды; при жаре, сильном кровотечении или задержке мочи обратитесь к врачу.