

Сексуальная дисфункция у женщин

WARWIKI

Информация для пациента · Частые проблемы, которые поддаются лечению

Сексуальная дисфункция у женщин — это стойкие проблемы с **желанием, возбуждением, оргазмом или болью во время секса**, которые вас беспокоят. Это распространённое состояние в любом возрасте; причин, как правило, несколько — физические, гормональные и эмоциональные. В большинстве случаев оно поддаётся лечению. Не стесняйтесь говорить об этом с врачом — вы получите помощь без осуждения.

Об этом состоянии

Жалобы обычно относятся к одной или нескольким категориям:

- **Желание** — сниженное половое влечение
- **Возбуждение** — трудности с достижением или сохранением возбуждения; сухость
- **Оргазм** — затруднённое достижение оргазма
- **Боль** — дискомфорт во время или после секса (диспареуния)

Причины

Чаще всего — сочетание факторов:

- **Менопауза / низкий эстроген** — сухость и истончение влагалища (GSM)
- **Напряжённое или болезненное тазовое дно**, пролапс или опущения из-за недержания
- Заболевания, перенесённые операции, некоторые **лекарства** (например, ряд антидепрессантов)
- Стресс, настроение, сон и отношения в паре

ТЕРМИНЫ

Либи́до

Половое влечение, сексуальный интерес.

Возбужде́ние

Физическая реакция тела, включая увлажнение влагалища.

Диспареу́ния

Боль во время или после полового акта.

GSM

Генитоуринарный синдром менопаузы — сухость и истончение тканей из-за нехватки эстрогена.

Вагинальный эстроген

Местный препарат в низкой дозе для устранения сухости и дискомфорта.

Физиотерапия тазового дна

Лечение боли, вызванной напряжёнными мышцами таза.

Лубрикант / увлажнитель

Негормональные средства для устранения сухости и трения.

ЭТО «ТОЛЬКО В ГОЛОВЕ»? Нет. Существуют реальные, поддающиеся лечению физические причины — сухость, напряжённое тазовое дно, пролапс, побочные эффекты лекарств — наряду с эмоциональными и партнёрскими факторами. Полноценное обследование охватывает все аспекты, и большинство пациенток достигают значительного улучшения.

Как это обследуют

- Доверительная и конфиденциальная беседа о ваших жалобах и истории болезни
- Осмотр для выявления устранимых физических причин (сухость, напряжение тазового дна, пролапс)
- Анализ принимаемых лекарств и общего состояния здоровья

Как это лечат

- 1 **Устранение сухости и боли** — лубриканты и увлажнители, а также **вагинальный эстроген** при менопаузальной сухости.
- 2 **Физиотерапия тазового дна** при боли или мышечном напряжении.
- 3 **Лечение сопутствующих причин** — пролапса, недержания мочи или лекарств, снижающих влечение.
- 4 **Психологическое консультирование / сексуальная терапия** с вниманием к настроению, стрессу, сну и отношениям.

Полезные шаги

- Используйте **лубрикант** во время близости и **увлажнитель** регулярно при сухости.
- Открытый разговор с партнёром снижает напряжение и боль.
- Дайте лечению время; сочетание методов, как правило, даёт лучший результат.

Сообщите врачу о:

- Новой боли, **уплотнении или образовании**, необычном кровотечении
- Кровянистых выделениях после секса или после менопаузы
- Любых опасениях, связанных с безопасностью в отношениях

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Сексуальные проблемы — сниженное желание, трудности с возбуждением, оргазмом или боль — распространены, имеют реальные причины и, как правило, поддаются лечению.
2. Многие причины физические и устранимые (сухость, напряжённое тазовое дно, лекарства); эмоциональные и партнёрские факторы тоже важны.
3. Не стесняйтесь говорить об этом с врачом. Сообщайте о новой боли, образовании или кровотечении после секса или после менопаузы.