

HoLEP (Энуклеация простаты лазером)

Информация для пациента · Лазерная операция при увеличенной простате любого размера

WARWIKI

HoLEP — лазерная операция при увеличенной простате (BPH): внутренняя ткань, вызывающая закупорку, удаляется через эндоскоп **без разреза на коже**. Главное преимущество — эффективность при **простате любого размера**, включая очень крупные железы, которые раньше требовали открытой операции. Кровопотеря минимальна, результат стойкий.

Об этой операции

Через эндоскоп в уретре **голмиевый лазер** отделяет всю внутреннюю часть простаты (ту, что создаёт препятствие) от наружной капсулы — как косточку от плода. Высвобожденная ткань перемещается в мочевого пузырь, измельчается и удаляется (**морцелляция**). Поскольку препятствующая ткань удаляется полностью, результат **стойкий** и повторное лечение требуется редко.

Преимущества HoLEP

- **Подходит для простаты любого размера**, в том числе очень крупной
- **Минимальное кровотечение** — часто возможна операция при приёме разжижителей крови
- Короткий срок с катетером и стойкий результат

Это специализированная техника — наилучшие результаты достигаются у опытного хирурга.

ТЕРМИНЫ

HoLEP

Энуклеация простаты голмиевым лазером.

BPH

Доброкачественная (незлокачественная) гиперплазия простаты.

Энуклеация

Удаление всей внутренней части простаты из наружной капсулы.

Голмиевый лазер

Лазер, разделяющий и запаивающий ткань с минимальным кровотечением.

Морцелляция

Измельчение высвобождённой ткани для её удаления.

Ретроградная эякуляция

«Сухой» оргазм — частое, безвредное последствие операции.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ? У большинства мужчин восстанавливается сильная, устойчивая струя мочи. Как и при других операциях на простате, **ретроградная эякуляция** («сухой» оргазм) возникает часто. В первые недели возможны временные позывы или небольшое подтекание мочи — как правило, они проходят; серьёзные нарушения эрекции или стойкое недержание встречаются редко.

Как подготовиться

- Операция под **общей или спинальной анестезией** — соблюдайте назначения по голоданию и приёму лекарств.
- Предварительный **анализ мочи** для исключения инфекции.
- Организуйте сопровождающего; рассчитывайте на короткий срок с катетером.

Что происходит & После

- 1 Вы спите или обезболены; вводятся антибиотики.
- 2 Лазер энуклеирует внутреннюю часть простаты; ткань измельчается и удаляется.
- 3 Устанавливается катетер, который обычно снимают примерно через **сутки**; многие пациенты уходят домой в тот же день или после одной ночи.

Несколько недель возможны **кровянистая моча**, жжение и позывы; по назначению врача выполняйте упражнения для тазового дна, избегайте натуживания и тяжёлых нагрузок.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Не получается мочиться** после удаления катетера
- **Сильное кровотечение или сгустки**, затрудняющие мочеиспускание
- Повышение температуры или озноб
- Подтекание мочи, которое не улучшается в первые недели

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. HoLEP удаляет всю обструктирующую внутреннюю часть простаты лазером через эндоскоп — подходит для **любого размера** железы, с минимальной кровопотерей и стойким результатом.
2. Ожидайте сильную струю; ретроградная эякуляция обычна, ранние позывы и подтекание, как правило, проходят.
3. Срок с катетером короткий. Обратитесь к врачу при невозможности мочиться, сильном кровотечении или температуре.