

Ileal conduit — это способ отведения мочи после удаления мочевого пузыря или утраты его функции. Хирург использует короткий отрезок тонкой кишки, чтобы направить мочу от почек к небольшому отверстию на животе (стома), откуда она поступает в лёгкий мешок. Это наиболее простой и распространённый вид деривации мочи.

Об этой операции

Отрезок тонкой кишки длиной 15–20 см используется как **проводник** — он не накапливает мочу. Мочеточники (трубки от почек) подшиваются к нему, а один конец выводится на кожу живота в виде **стомы**, как правило в правой нижней части живота. Поскольку моча выделяется **непрерывно**, вы носите лёгкий мешок (**урологический мешок-калоприёмник**), который опорожняете несколько раз в день и меняете каждые несколько дней.

- **Ничего не нужно контролировать и катетеризировать.**
- Остальная часть кишечника **соединяется обратно**, пищеварение продолжается нормально.
- **Медсестра по стомам** обучит вас уходу за стомой и мешком.

Это безопасно?

Ileal conduit является стандартным методом деривации мочи более 70 лет — это наиболее простая операция с минимальным временем вмешательства. Как и любая крупная операция, она сопряжена с рисками (кровотечение, инфекция, несостоятельность анастомоза кишки или мочеточников). Со временем возможны проблемы со стомой или кожей, инфекции мочевыводящих путей (UTI), нарушения минерального обмена или уровня витаминов — всё это контролируется при регулярных осмотрах.

ТЕРМИНЫ

Деривация мочи

Новый путь для выведения мочи из организма при удалении или неработающем мочевом пузыре.

Ileal conduit

Короткий отрезок тонкой кишки, по которому моча отводится к стоме.

Стома

Небольшое отверстие на животе из кишечной ткани, через которое выходит моча.

Урологический мешок

Мешок (аппарат), надеваемый на стому для сбора мочи.

Мочеточники

Трубки, по которым моча поступает от почек; они подшиваются к кондуиту.

Медсестра по стомам

Специалист, который отмечает место стомы и обучает уходу за ней и мешком.

Слизь

Секрет кишечника; нити слизи в моче — это норма.

Перистомальная кожа

Кожа вокруг стомы, которую нужно содержать в чистоте и защищать.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей анестезией — вы ничего не почувствуете. После неё ожидайте болезненности в животе; кишечнику требуется несколько дней, чтобы «заработать» (начинают с жидкости, затем расширяют диету). Сама стома не имеет болевых ощущений. Большинство пациентов находятся в больнице около 5–7 дней.

Как подготовиться (до операции)

- Операция проводится под **общей анестезией** — соблюдайте все предоперационные инструкции (голодание, отмена лекарств, включая антикоагулянты). Возможна **подготовка кишечника**.
- Встретьтесь с **медсестрой по стомам**: она отметит оптимальное место для стомы, пока вы сидите, стоите и лежите — это важно для комфортного и герметичного прилегания мешка.
- **Не курите** — курение замедляет заживление — и организуйте помощь дома после выписки.

Сообщите врачу заранее, если вы:

- Принимаете **антикоагулянты** или имеете активную инфекцию
- Страдаете **заболеванием кишечника** (болезнь Крона, колит) или перенесли операции на животе или лучевую терапию

Что происходит во время операции

- 1 Вы под анестезией; вводятся антибиотики.
- 2 Выделяется короткий отрезок кишки; оставшаяся часть кишечника соединяется.
- 3 Мочеточники подшиваются к сегменту кишки.
- 4 Один конец выводится на кожу живота в виде стомы; устанавливаются мягкие стенты и дренаж на время заживления.

После операции

- Выписка через **5–7 дней**. Медсестра по стомам обучит вас **опорожнять мешок** (несколько раз в день) и **менять аппарат** (раз в несколько дней).
- Нити **слизи** в моче — норма (так работает кишечник). **Пейте достаточно жидкости** и ухаживайте за кожей вокруг стомы.
- **Не поднимайте тяжести около 6 недель**. Вас будут наблюдать пожизненно (функция почек, витамин B12).

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Стома потемнела, стала синюшной или втянулась
- **Мало мочи или она отсутствует** в мешке в течение нескольких часов
- Сильная боль в животе, рвота или **отсутствие газов и стула** (кишечник не работает)
- Обильное кровотечение, покраснение или выделения из раны

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Ileal conduit — это отрезок тонкой кишки, по которому моча отводится к стоме на животе и собирается в мешок; катетеризация не нужна.
2. Подготовка: соблюдайте голодание и инструкции по подготовке кишечника, встретьтесь с медсестрой по стомам, не курите, организуйте помощь дома.
3. Слизь в моче — норма; медсестра по стомам обучит вас уходу за мешком и кожей вокруг стомы.