

Имплантируемая стимуляция большеберцового нерва (ITNS)

WARWIKI

Информация для пациента · Небольшое имплантируемое устройство у лодыжки при гиперактивном мочевом пузыре

ITNS — небольшое устройство, устанавливаемое у лодыжки, которое мягко стимулирует **большеберцовый нерв** и успокаивает **гиперактивный мочевой пузырь**: urgentные позывы, учащённое мочеиспускание и urgentное недержание. Принцип действия совпадает с PTNS (офисной процедурой стимуляции у лодыжки), но так как устройство **имплантировано**, терапию вы получаете **дома** — без еженедельных визитов.

Как это действует

Большеберцовый нерв, расположенный у внутренней лодыжки, соединяется с теми же спинальными нервами, которые управляют мочевым пузырём. Мягкая стимуляция посылает сигналы, **переобучающие и успокаивающие** гиперактивный мочевой пузырь — уменьшая позывы и эпизоды недержания. Имплант самостоятельно генерирует эти импульсы, поэтому повторные визиты в клинику не нужны. Лекарства не используются, системных побочных эффектов нет.

Подходит ли это мне?

- Хороший вариант при **гиперактивном мочевом пузыре (ОАВ)** — urgentных позывах, учащённом мочеиспускании, urgentном недержании — особенно если лекарства не помогали или вызывали побочные эффекты
- Без лекарств — подходит, если вы не можете принимать препараты для мочевого пузыря
- Часто выбирают те, кому **офисный PTNS помогал**, но еженедельные визиты были неудобны
- В отличие от сакрального «кардиостимулятора мочевого пузыря», большинству устройств ITNS **тестовый период не нужен**

ТЕРМИНЫ

Гиперактивный мочевой пузырь

Urgentные позывы и учащённое мочеиспускание из-за преждевременных сокращений пузыря.

Большеберцовый нерв

Нерв у лодыжки, связанный с нервным снабжением мочевого пузыря.

Нейромодуляция

Использование мягких электрических импульсов для успокоения гиперактивных нервов.

Имплант

Небольшое устройство, вводимое под кожу в ходе короткой процедуры.

Носимый блок

Съёмный браслет на лодыжку, питающий и управляющий некоторыми устройствами.

Местная анестезия

Обезболивающий препарат: область онемевшая, вы остаётесь в сознании.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Устройство устанавливают в ходе **короткой амбулаторной процедуры** под местной анестезией — вы в сознании, боли не должно быть, лишь небольшое давление. Сама терапия ощущается как лёгкое **покалывание** или мягкое сжатие пальцев стопы — не боль. Большинство пациентов уходят домой в тот же день.

Как это проводят

- 1 Через **небольшой разрез у лодыжки** устройство размещают рядом с большеберцовым нервом — обычно под местной анестезией, примерно за **20–35 минут**.
- 2 Рана ушивается и заживает; терапию, как правило, начинают через **несколько недель**.
- 3 Лечащая команда настраивает параметры и объясняет, как пользоваться устройством.

Два типа устройств

- Один тип — **полностью имплантируемый со встроенной батареей**: ничего не нужно носить или заряжать; стимуляция происходит автоматически по расписанию.
- Другой тип **не имеет батареи внутри**; вы надеваете небольшой **браслет на лодыжку**, который питает устройство и позволяет проводить сеансы дома самостоятельно.
- Ваш хирург сообщит, какое устройство вам устанавливают и как им пользоваться.

После

- Несколько дней — лёгкая болезненность или отёк у лодыжки; держите рану чистой и сухой, ненадолго ограничьте нагрузку.
- Эффект **нарастает в течение недель**: у большинства улучшение составляет не менее половины симптомов, и оно сохраняется годами.
- При необходимости устройство можно **отключить или удалить**. Правила MPT зависят от типа устройства — всегда сообщайте команде визуализации о наличии импланта.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Покраснение, отёк, выделения или повышение температуры (возможная инфекция)
- Новая или усиливающаяся боль в области лодыжки
- **Внезапное исчезновение эффекта** или дискомфортная стимуляция

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. ITNS — небольшой имплант у лодыжки, успокаивающий гиперактивный мочевого пузыря: домашняя версия PTNS, без лекарств и системных побочных эффектов.
2. Устройство устанавливают в короткой амбулаторной процедуре под местной анестезией; большинству устройств **тестовый период не нужен**.
3. Эффект нарастает неделями и сохраняется годами; звоните при инфекции у лодыжки, новой боли или внезапной потере эффекта.