

# Надувной протез полового члена (IPP)

WARWIKI

Информация для пациента · Что ожидать перед операцией по имплантации протеза

Надувной протез полового члена (IPP) — имплант, полностью скрытый под кожей, который позволяет получить устойчивую эрекцию по желанию — для мужчин, у которых эректильная дисфункция (ED) не поддаётся лечению таблетками, инъекциями или другими методами. Управление осуществляется насосом, спрятанным в мошонке. В этом листке описано, как работает устройство, как подготовиться и чего ожидать.

## Об этой процедуре

Если **эректильная дисфункция (ED)** не поддаётся лечению таблетками, вакуумным устройством или инъекциями, имплант является наиболее надёжным следующим шагом с очень высоким уровнем удовлетворённости. Устройство из трёх частей устанавливается полностью под кожей:

- Два мягких **цилиндра** внутри полового члена, которые наполняются жидкостью для создания эрекции
- **Насос** в мошонке: сжимайте для надувания, нажимайте для спуска
- **Резервуар** с жидкостью в нижней части живота

**Как пользоваться:** несколько раз сожмите насос, чтобы наполнить цилиндры и получить эрекцию; нажмите клапан сброса, чтобы вернуться в расслабленное состояние. Вы сами выбираете время и продолжительность.

## Что важно знать

Это **необратимый выбор**. Установка импланта изменяет эректильную ткань, поэтому впоследствии естественные эрекции и другие методы лечения ED (таблетки, инъекции) перестают работать — эрекция будет возможна только с помощью импланта. При этом устройство **не влияет на мочеиспускание, чувствительность, оргазм или эякуляцию**. Как любой имплант, оно несёт определённый риск — прежде всего инфекции; через много лет устройство может изнашиваться и потребовать замены.

## ТЕРМИНЫ

### Эректильная дисфункция (ED)

Затруднение при достижении или поддержании эрекции, достаточной для полового акта.

### Протез полового члена (IPP)

Импантируемое устройство, создающее эрекцию по желанию.

### Цилиндры

Две части внутри полового члена, наполняемые жидкостью для создания эрекции.

### Насос

Часть в мошонке: сжимайте для надувания, нажимайте для спуска.

### Резервуар

Ёмкость с жидкостью в нижней части живота.

### Активация

Визит через ~4–6 недель после операции: устройство впервые используется, вас обучают управлению.

### Циклическая работа

Надувание и спускание ежедневно после заживления — поддерживает работу и помогает сохранить длину.

### Общая анестезия

Препараты, которые погружают вас в сон без боли на время операции.

**БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО?** Операция проводится под общей или спинальной анестезией — во время неё вы ничего не чувствуете. Она занимает около часа, и многие пациенты уходят домой в тот же день. Не используйте устройство до его активации хирургом.

### Как подготовиться (до операции)

- Операция проводится под **общей или спинальной анестезией** — соблюдайте все предоперационные указания (голодание, отмена лекарств, включая антикоагулянты).
- Профилактика инфекции крайне важна:** любая инфекция (в том числе мочевых путей) устраняется до операции; вам назначат душ с антисептическим мылом и антибиотики.
- Не курите и не используйте вейп;** при **сахарном диабете** команда врачей добьётся хорошего контроля сахара крови — оба условия снижают риск инфекции.

#### Сообщите команде заранее, если:

- У вас **сахарный диабет** или проблемы с руками (насосом нужно управлять самостоятельно)
- Ранее были операции на тазу или половом члене, лучевая терапия или предыдущий имплант

### Что происходит во время операции

- 1 Вы находитесь под анестезией (спите или обезболены от пояса вниз); вводятся антибиотики.
- 2 Через один небольшой разрез (у мошонки или в нижней части живота) хирург размещает **цилиндры** в половом члене, **насос** в мошонке и **резервуар** в нижней части живота — всё под кожей.
- 3 Устройство проверяется, затем оставляется в спущенном состоянии для заживления. При необходимости временно устанавливается катетер.

### После операции

- Ожидайте **отёка и кровоподтёков** в области полового члена и мошонки 1–2 недели. Носите суспензорий, прикладывайте лёд, держите разрез чистым и сухим.
- Не используйте устройство и не занимайтесь сексом без разрешения хирурга** — обычно **~4–6 недель**. На визите активации его впервые надувают и обучают вас; затем **ежедневно надувайте и спускайте** его («циклическая работа») первые месяцы.

#### Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб, нарастающее покраснение, боль, отёк или выделения из разреза
- Невозможность помочиться
- Сильная или нарастающая боль, или половой член приобрёл синюшный или тёмный цвет

### ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. IPR — скрытое устройство при ED, не поддающейся другим методам лечения: сожмите насос в мошонке для эрекции, нажмите клапан сброса для спуска.
2. Это **необратимый выбор** (естественные эрекции и таблетки/инъекции после операции не работают), однако устройство **не влияет на мочеиспускание, чувствительность, оргазм или эякуляцию**.
3. Профилактика инфекции — главное: устраните инфекции заранее, не курите, используйте антисептик и антибиотики. Не пользуйтесь устройством до активации (~4–6 недель).