

Периодическая самокатетеризация (ISC)

Информация для пациента · Самостоятельное опорожнение мочевого пузыря с помощью тонкого катетера

WARWIKI

Периодическая самокатетеризация (ISC) — это способ опорожнить мочевой пузырь, самостоятельно введя тонкий мягкий катетер, выпустив мочу и удалив его. Процедуру выполняют несколько раз в день. ISC применяется, когда мочевой пузырь не опорожняется самостоятельно. После обучения она занимает несколько минут, даёт свободу и защищает почки.

Зачем это нужно

Если мочевой пузырь не может полностью опустеть — после некоторых операций, при **нейрогенном мочевом пузыре**, пролапсе или обструкции — остаточная моча вызывает инфекции, недержание и повышение давления, повреждающее почки. ISC **полностью опорожняет мочевой пузырь** по расписанию, устраняя эти проблемы.

Преимущества перед постоянным катетером

- **Меньше инфекций**, чем при постоянном (оставленном) катетере
- **Нет мешка** — между катетеризациями ничего не прикреплено
- Лучшая долгосрочная защита мочевого пузыря и почек

Поначалу это кажется сложным, но большинство пациентов — и их ухаживающих — быстро осваивают технику с помощью медсестры.

ТЕРМИНЫ

ISC

Периодическая самокатетеризация — самостоятельное опорожнение мочевого пузыря с последующим удалением катетера.

Катетер

Тонкая мягкая трубка, вводимая в мочевой пузырь для отведения мочи.

Остаточная моча

Моча, остающаяся в мочевом пузыре после мочеиспускания.

Нейрогенный мочевой пузырь

Мочевой пузырь, работающий неправильно из-за неврологического нарушения.

Чистая техника

Мытьё рук и области введения — чисто, но не стерильно.

Постоянный катетер

Катетер, оставленный с мешком (то, что ISC позволяет избежать).

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Как правило, нет — большинство пациентов ощущают лишь лёгкое давление; современные катетеры предварительно смазаны и очень тонкие. В первые несколько раз возможен незначительный дискомфорт или небольшие выделения. Медсестра обучит вас шаг за шагом, пока вы не будете чувствовать себя уверенно.

Техника выполнения (чистый метод)

- 1 **Вымойте руки** и подготовьте принадлежности; очистите отверстие уретры.
- 2 **Аккуратно введите** смазанный катетер, пока не появится моча; продвиньте ещё немного.
- 3 Дайте мочевому пузырю **полностью опустеть**, затем медленно извлеките катетер.
- 4 **Утилизируйте** одноразовые катетеры (или очистите многоразовые согласно инструкции) и вымойте руки.

Как часто

- Обычно **каждые 4–6 часов** (около 4–6 раз в день) — расписание устанавливает ваш врач.
- Не пропускайте — регулярность предотвращает переполнение и инфекции.
- Пейте как обычно; при необходимости фиксируйте объём выделений.

Полезно знать

- Можно выполнять в любом чистом туалете; принадлежности компактны и незаметны.
- Небольшая мутность или бактерии в моче — норма; инфекция мочевыводящих путей (UTI) лечится только при наличии **симптомов**.
- Ухаживающий может быть обучен, если вы не можете выполнять катетеризацию самостоятельно.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Не удаётся ввести катетер или выделяется очень мало мочи при ощущении полноты
- Жар, озноб или боль в пояснице/боку (возможная инфекция)
- Продолжающееся **кровотечение** или выраженная боль

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. ISC опорожняет мочевой пузырь, который не справляется сам, — защищает почки и предотвращает инфекции и недержание.
2. Используйте чистую технику по расписанию (обычно каждые 4–6 часов); медсестра обучит вас до полной уверенности.
3. Процедура, как правило, безболезненна и безопаснее постоянного катетера. Обратитесь к врачу, если не можете ввести катетер, опустошить пузырь или появилась температура.