

Agonistes bêta-3 (pour la vessie hyperactive)

WARWIKI

Information pour le patient · Un médicament récent avec moins d'effets indésirables

Les agonistes bêta-3 sont une classe récente de médicaments pour la **vessie hyperactive** — urgences urinaires, mictions fréquentes et fuites par urgenturie. Ils détendent la vessie pour qu'elle retienne davantage d'urine, et provoquent **moins de sécheresse buccale, de constipation et d'effets sur la mémoire** que les anciens anticholinergiques. Les deux médicaments de cette classe sont **mirabegron (Myrbetriq)** et **vibegron (Gemtesa)**.

Comment ça fonctionne

Ces médicaments activent les **récepteurs bêta-3** de la paroi vésicale, ce qui **détend le muscle de la vessie** pendant le remplissage. Une vessie plus détendue génère moins d'urgences soudaines et moins de mictions — via un mécanisme différent des anticholinergiques.

À quoi s'attendre

- L'effet s'installe en **quelques semaines** ; le médicament se prend **une fois par jour**.
- Généralement **bien toléré** — peu ou pas de sécheresse buccale.
- Un bon choix pour les **personnes âgées** ou celles ayant eu des effets indésirables avec les anticholinergiques.
- Peut parfois être associé à un anticholinergique en cas de symptômes persistants.

COMPRENDRE LES TERMES

Vessie hyperactive (VH)

Urgences et mictions fréquentes causées par des contractions prématurées de la vessie.

Agoniste bêta-3

Médicament qui détend la vessie via les récepteurs bêta-3.

Mirabegron / vibegron

Les deux médicaments de cette classe.

Anticholinergique

Ancienne classe de médicaments pour la VH ; les agonistes bêta-3 évitent bon nombre de ses effets.

Tension artérielle

Le mirabegron peut l'augmenter légèrement — elle est surveillée.

POURQUOI CHOISIR CES MÉDICAMENTS PLUTÔT QUE LES ANCIENS ? Les agonistes bêta-3 sont aussi efficaces que les anticholinergiques contre la vessie hyperactive, mais avec **beaucoup moins de sécheresse buccale et de constipation**, et sans les effets sur la mémoire — c'est pourquoi ils sont souvent préférés, surtout chez les personnes âgées. Le principal point de surveillance est la tension artérielle.

Comment le prendre

- Prenez-le **une fois par jour** comme prescrit ; laissez quelques semaines pour ressentir l'effet.
- Associez-le à la rééducation vésicale et aux exercices du plancher pelvien pour de meilleurs résultats.
- Maintenez vos consultations de suivi pour que votre équipe soignante puisse évaluer l'effet et surveiller votre tension artérielle.

Sécurité — points essentiels

- **Le mirabegron peut élever la tension artérielle** — elle est surveillée, et ce médicament est évité si votre tension est très élevée ou non contrôlée. (Le vibegron a peu d'effet sur la tension artérielle.)
- Signalez à votre équipe tous vos autres médicaments — le mirabegron peut modifier le taux de certains d'entre eux.
- Comme pour tout traitement de la VH, signalez toute difficulté à vider la vessie.

Effets secondaires courants

- Généralement bénins — maux de tête, nez bouché
- Élévation de la tension artérielle (surtout avec le mirabegron)
- Infection urinaire ou légère constipation

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Une tension artérielle très élevée** ou un mal de tête intense
- Vous **ne pouvez pas uriner** ou avez l'impression de ne pas vider la vessie
- Gonflement du visage, des lèvres ou de la langue, ou difficultés respiratoires (allergie rare) — consultez en urgence

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Les agonistes bêta-3 détendent la vessie pour soulager les symptômes de la vessie hyperactive, avec **bien moins de sécheresse buccale** que les anciens médicaments.
2. Ils conviennent souvent aux personnes âgées ou après des effets indésirables anticholinergiques ; attendez quelques semaines avant de juger.
3. Le mirabegron peut élever la tension artérielle — respectez vos contrôles. Appelez si vous ne pouvez pas uriner ou si votre tension augmente brutalement.