

5-Alpha-Reductase Inhibitors (Pinapaliit ang Prostate)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Mga tableta na unti-unting pinapaliit ang lumaking prostate

Ang 5-alpha-reductase inhibitors ay mga tableta na **dahan-dahang pinapaliit ang lumaking prostate (paglaki ng prostate — BPH)**, nagpapabuti ng daloy ng ihi, at nagbababa ng panganib ng pagbara sa ihi at operasyon sa prostate. Ang dalawa ay **finasteride (Proscar)** at **dutasteride (Avodart)**. Dahan-dahan ang epekto — kailangang maghintay ng ilang buwan.

Paano Ito Gumagana

Hinahadlangan ng mga tableta ang pagbabago ng testosterone sa katawan tungo sa **DHT**, ang hormone na nagpapalaki ng prostate. Sa mas kaunting DHT, ang prostate ay **unti-unting pinapaliit**, na nagpapalawak ng daanan ng ihi. Dahil matagal ang proseso, ang buong benepisyo ay makikita pagkatapos ng **3–6 buwan** — hindi ito mabilis na lunas at madalas inuinom kasabay ng mabilis na gumagaling na alpha blocker.

Ano ang Maaasahan

- Pinaka-epektibo para sa **mas malalaking** prostate; naiipong ang benepisyo sa loob ng mga buwan.
- Iniinom **isang beses sa isang araw**, pangmatagalan.
- Sa paglipas ng panahon, nagbababa ng panganib ng **hindi makaihi (urinary retention)** at pangangailangan ng operasyon sa prostate.

MGA TERMINO

5-ARI

5-alpha-reductase inhibitor (finasteride, dutasteride).

BPH

Benign prostatic hyperplasia — paglaki ng prostate.

DHT

Ang hormone na nagpapalaki ng prostate; ibinababa ito ng gamot.

PSA

Pagsusuri sa dugo para sa prostate; halos kino-kalahati ng gamot ang resulta nito.

Urinary retention

Hindi makalabas ng ihi — nabababaan ang panganib sa paglipas ng panahon.

Finasteride / dutasteride

Ang dalawang gamot sa klaseng ito.

NAKAKAAPEKTO ITO SA INYONG PSA TEST Ibinababa ng mga tableta ang inyong **PSA sa dugo nang halos kalahati**. Hindi ito masamang bagay, ngunit kailangang malaman ng inyong doktor upang mabasa nang tama ang cancer screening ng prostate — sa pangkalahatan, ang inyong PSA ay **dino-doble** para maihambing sa normal. Tiyakin na alam ng bawat clinician na iniinom ninyo ito.

Paano Inumin

- **Isang beses sa isang araw**, sa parehong oras; maging matiyaga — buwan pa bago maging epektibo.
- Huwag itigil dahil lang hindi pa kayo nakaramdam ng pagbabago.
- Karaniwan itong inuinom pangmatagalan upang mapanatiling maliit ang prostate.

Mahahalagang Paalala sa Kaligtasan

- **Ang buntis na kababaihan ay hindi dapat humawak** ng dinurog o sirang tableta (panganib sa male fetus); ang buong naka-coat na tableta ay ligtas hawakan.
- **Huwag mag-donate ng dugo** habang iniinom ito at sa isang panahon pagkatapos itigil.
- Ipaalam sa inyong care team ang anumang **pagbabago sa mood o depresyon**, na naiulat na ng ilang pasyente.

Mga Karaniwang Side Effect

- Pagbaba ng libog, hirap sa erection, o pagkaunti ng tamod
- Pamamaga o pananakit ng dibdib (breast)
- May ilang lalaki na nag-uulat na tumatagal ang mga side effect sa sekswal — talakayin ang anumang alalahanin

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Bukol sa dibdib**, sakit, o labasan sa utong
- Bagong **depresyon** o pagbabago ng mood
- Hindi kayo makaihi (humanap ng agarang tulong)

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang 5-ARIs ay unti-unting pinapaliit ang prostate upang mapabuti ang daloy ng ihi at mabawasan ang panganib ng retention at operasyon — bigyan ng 3–6 buwan.
2. Ibinababa nito ang inyong **PSA nang halos kalahati** — tiyaking isinasaalang-alang ito ng inyong doktor sa cancer screening ng prostate.
3. Ang mga buntis na babae ay hindi dapat humawak ng sirang tableta, at huwag mag-donate ng dugo habang iniinom ito. Iulat ang mga pagbabago sa dibdib o bagong depresyon.